

[SALIR](#) →

PROTECCIÓN DE DATOS
CONDICIONES GENERALES DE USO

EL MEDICO

DIARIO ELECTRÓNICO DE LA SANIDAD

Número 1281 | 02/04 Octubre 2004 | Actualizado diariamente a las 20 hs. | Declarado de interés científico por la OMC

- TITULARES POR E-MAIL
- SUMARIO**
- ACTUALIDAD
 - ÚLTIMA HORA
 - NOTICIAS
 - OMC Y SOC. CIENTÍFICAS
 - DOCUMENTOS E INFORMES
 - MEDICINA Y DERECHO
 - ASESORÍA FISCAL Y TRIBUT.
 - DEBATES Y ENCUESTAS
 - TRIBUNA ABIERTA Y ANÁLISIS
 - HUMANISMO MEDICO
 - ACTUALIZACIÓN MEDICA
 - FORMACIÓN CONTINUADA
 - BIBLIOGRAFÍA
 - FORMACIÓN ACREDITADA
 - PUBLICACIONES
 - RINCÓN DE LA TERAPÉUTICA
 - SERVICIOS
 - BUSCADORES SANITARIOS
 - MEDICAMENTOS
 - AYUDA AL DIAGNÓSTICO
 - PROTOCOLOS / GUÍAS
 - OFERTAS Y DEMANDAS
 - CONGRESOS
 - AGENDA
 - CONGRESOS ONLINE
 - VIDEOSIMPOSIOS
 - STAFF

OMC Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS

SOCIEDADES

La insuficiencia cardiaca es la primera causa de hospitalización en las sociedades desarrolladas

Un experto del Congreso Mundial de Medicina Interna aboga por incidir en las medidas de precaución y manejo de este síndrome

Redacción, Granada.- La insuficiencia cardiaca es la primera causa de hospitalización en las sociedades desarrolladas, según ha explicado el doctor Christopher Davidson, cardiólogo del Centro Cardíaco Sussex, en Brighton, Reino Unido, durante el 27º Congreso Mundial de Medicina Interna que se está celebrando en Granada, con la participación de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

El doctor Davidson explicó que la insuficiencia cardiaca, resultado de una hipertensión persistente o la enfermedad coronaria, se trata de una de las causas más frecuentes de muerte y discapacidad en las sociedades industrializadas. Este dato pone de manifiesto la importancia de incidir en medidas de prevención y manejo de este síndrome, sobre todo teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población y la disminución de la mortalidad de los síndromes coronarios que evolucionan a insuficiencia cardiaca.

El fallo cardíaco es principalmente un problema que se presenta en los ancianos, fundamentalmente en torno a los 80 años, según ha indicado este especialista. Los principales síntomas que caracterizan este síndrome son dificultad al respirar, letargo y la retención de líquidos, que suele manifestarse en hinchazón de las piernas.

La mayoría de estudios que han analizado la calidad de vida de estos pacientes ha puesto de manifiesto que presentan una incapacidad comparable a aquellos pacientes que se ven sometidos a un tratamiento de diálisis peritoneal.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico y con un ecocardiograma. Esta técnica permite identificar la gravedad del daño que sufre el corazón y pone de manifiesto otras anomalías, como la obstrucción valvular, que puede ser un importante factor contributivo.

Según detalla este especialista, "si bien muchos pacientes con este síndrome presentan un funcionalidad del corazón muy pobre, hay un reconocimiento creciente de que una minoría significativa preserva la función ventricular izquierda (conocida a menudo como insuficiencia cardiaca diastólica). En este caso, dice, suele tratarse de mujeres más mayores y con una alta incidencia de hipertensión. Publicaciones recientes han puesto de manifiesto que el pronóstico de dichas pacientes puede, sin embargo, ser tan malo como el de aquellos con una función ventricular izquierda pobre.

Avances del tratamiento en la última década

Varios estudios han puesto de manifiesto que la insuficiencia cardiaca es una potencial amenaza para la vida con una tasa de supervivencia de cinco años, cifra comparable al pronóstico que presentan algunos cánceres. "La mortalidad, dice, es alta en todas las edades y es mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, hay recientes evidencias que sugieren que la mortalidad en esta condición puede estar mejorando, como resultado quizás de los avances experimentados en el tratamiento médico durante la última década".

- BUS
- ARCHIVO
- INT
- busca
- BUSCA DE CIENT SAN
- ÚLT
- TITULAR POP
- OFICI DE
- REGIST GRATU
- RINCO TERAP
- ARCHI EL
- INFORME
- El siste las desi de genc
- PACIEN

ARCHIVO EL MEDICO

FORMACIÓN ACREDITADA

Actividades administrativo-legales

FORMACIÓN ACREDITADA

NUEVO EL MEDICO
curso de farmacología aplicada

Revista "El Médico"

EL MEDICO

Acude al ce solicitando familia un c sobre el est psiquica de los efectos arma de fue ante la solli emite un dc papel norm timbrar.

Revista Nº- 915

FOROS EL MEDICO



Además de estos avances, el doctor Davidson llama la atención, asimismo, sobre la prevención de la insuficiencia cardíaca, "que depende en el momento actual de un mejor control de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular", señala.

Una de las facetas más relevantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es, precisamente, la prevención de su desarrollo, que en la mayor parte de los casos depende de la existencia de cardiopatía isquémica y/o de la presencia de hipertensión arterial. Este último proceso es la primera causa de insuficiencia cardíaca, por lo que los expertos recuerdan que un mejor control de la presión arterial derivará en una disminución en la incidencia de insuficiencia cardíaca.

[índice de omc](#) | [sumario](#)

El Médico Interactivo es una publicación electrónica dirigida exclusivamente al profesional sanitario destinado a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación.

El Médico Interactivo está por ello reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V. 214-R-CM).

© Copyright EL MEDICO INTERACTIVO - Capitán Haya, 60 28020 Madrid (España)
elmedico@medynet.com
