


A ellas les hace más daño el alcohol



Vivienda para mujeres alcohólicas

 **El botellón lleva al «corazón de vacaciones»**

EP | SALAMANCA Actualizado Viernes, 13-02-09 a las 19:19

Las mujeres son más susceptibles que los varones al daño orgánico producido por el alcohol debido a los distintos **patrones de consumo, de composición corporal, diferencias metabólicas y farmacocinéticas**, según expertos en Medicina Interna.

Por ejemplo, en patología cardíaca, a dosis bajas de alcohol, las mujeres tienen un **menor efecto beneficioso** en la cardiopatía isquémica. En consumos excesivos de alcohol las mujeres presentan un **mayor grado de disfunción ventricular** dependiente de la dosis, con más riesgo de fracaso ventricular.

También, en la patología hepática por consumo de alcohol, las mujeres presentan una mayor propensión a desarrollar hepatitis alcohólica, fibrosis y cirrosis hepática con menores dosis acumuladas que los varones. Y el **deterioro cognitivo y la atrofia cortical** por alcohol es más frecuente en mujeres a igual consumo que los varones.

Así lo indicaron el jefe del Servicio de Medicina Interna II del Hospital Universitario de Salamanca y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Francisco Javier Laso, y el presidente electo de la Federación Europea de Medicina Interna, Ramón Pujol. Los facultativos participaron en la I Jornada sobre Alcohol y Alcoholismo, organizada por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Medicina Interna en la Hospedería Fonseca de

Salamanca.

Durante el encuentro se analizaron distintos estudios sobre infecciones y patologías cardiovasculares, además de la realización de talleres y otras actividades. Igualmente, en el marco de esta Jornada, la doctora Rosón, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Bellvitge (Hospitalet), presentó, como directora técnica del Registro Clínico Nacional sobre Alcohol en pacientes ingresados en Servicios de Medicina Interna (Estudio ASMI), los resultados del mismo, en el que se evaluaron la prevalencia y las formas de registro médico de consumo de alcohol en más de 1.000 pacientes ingresados en Servicios de Medicina Interna de 21 hospitales españoles.

En este informe, los profesionales pudieron comprobar que aproximadamente el 8 por ciento de los pacientes que acudieron a Medicina Interna presentaban un consumo alcohólico de riesgo, y cerca de un 4 por ciento tenían dependencia del alcohol. Por otra parte, en este mismo estudio se puede constatar que "al realizar la historia clínica de ingreso, al 40 por ciento de los pacientes no se le había interrogado acerca del consumo de alcohol. Y en los casos en que se había registrado este dato, sólo se había cuantificado el consumo de bebida alcohólica en un 18 por ciento de los pacientes, lo que refleja el defectuoso método de detección por parte del médico que les atiende", según la información facilitada por la SEMI. Francisco Javier Laso indicó que el médico de Atención Primaria "interroga poco o mal a la hora de poner en relación un cuadro clínico con el alcohol". Además, añadió que "se conoce poco porque muchas veces el interrogatorio se hace sesgadamente".

Consumo de riesgo

El jefe del Servicio de Medicina Interna II del Hospital Universitario de Salamanca y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Interna explicó que

Las mujeres presentan una mayor propensión a desarrollar hepatitis alcohólica, fibrosis y cirrosis hepática con menores dosis acumuladas que los varones

Los varones están en «riesgo» si beben diariamente 4 botellines

hay distintos niveles para hombres y mujeres en cuanto al consumo de alcohol que se puede considerar de "riesgo". En este sentido, señaló que los varones se incluyen dentro de este colectivo si beben diariamente 4 botellines de cerveza o vasos de vino, o tan sólo con la ingesta de 2 bebidas destiladas cada jornada. En el caso de las mujeres, Francisco Javier Laso explicó que las cantidades se reducen a 2 botellines de cerveza o vasos de vino, o una bebida destilada.

de cerveza o vasos de vino, o 2 bebidas destiladas cada jornada. En el caso de las mujeres las cantidades se reducen a 2 botellines de cerveza o vasos de vino, o una bebida destilada

ANUNCIOS GOOGLE

Aprende a Vivir sin Beber

Equipo Profesional Especializado Experiencia desde 1984 Confidencial <http://www.programavictoria.com>

Instituto Hipócrates

Clínica Especializada en Adicciones Centros seguimiento en toda España <http://www.institutohipocrates.com>

Tratamiento Alcoholismo

¿Tu conocido tiene problemas? Te ofrecemos la ayuda que buscas. <http://www.Sinesis-Adicciones.com>