



Lunes, 2 de febrero de 2009
Número 936. Año V

REUNIÓN DE LA SEMI EN GRAN CANARIA

Un tercio de los enfermos que ingresa en Medicina Interna padece diabetes mellitus

Redacción. Maspalomas

La asociación de diabetes mellitus tipo II y obesidad supone el primer factor de riesgo cardiovascular de crecimiento progresivo, implicado en alrededor de un 40 por ciento de la asistencia tanto en Atención Primaria como Especializada.

De hecho, uno de cada tres pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina Interna españoles padece diabetes, de acuerdo con las conclusiones de la III Reunión Anual de Diabetes y Obesidad, que ha organizado la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes (SED), el Grupo de Trabajo Corazón y Diabetes de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y el Grupo de Estudio de la Diabetes en la Atención Primaria de Salud (Gedaps).



Pedro Conthe (de la SEMI).

“Esta reunión es una muestra del interés de los internistas por contribuir al manejo coordinado de esta patología crónica, tanto con el médico de Atención Primaria, como con otros especialistas (cardiólogo, nefrólogo y endocrino)”, ha declarado el presidente de la SEMI, Pedro Conthe. Para el profesor Ángel Sánchez, coordinador del Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI, la principal novedad de esta cita científica reside en la revisión del inicio y del tratamiento de la diabetes tipo II según el algoritmo de la *American Diabetes Association* (ADA), que es referencia en la indicación terapéutica de

la diabetes, y cuyo primer autor, el profesor David Nathan, participó en el encuentro.