

ELCHE

Cien médicos estudian crear un registro de osteoporosis

La Sociedad Española de Medicina Interna aborda la patología en una reunión La fractura vertebral, de las más frecuentes

23.04.09 - M.T.B. | ELCHE

La ciudad acoge desde hoy hasta el sábado una reunión en la que participarán un centenar de médicos españoles, quienes analizarán la necesidad de crear el denominado Registro de osteoporosis, ROPE. Esta base de datos permitirá, según los organizadores, mejorar el conocimiento de esta patología y definir con mayor precisión las respuestas facultativas a esta enfermedad.

El objetivo es crear un listado nacional de pacientes con osteoporosis procedente de consultas de Medicina Interna. «Nos permitirá obtener datos epidemiológicos sobre la osteoporosis en nuestro medio, tipo de pacientes, problemas en su atención y cómo resolverlos», manifestó ayer el coordinador del Grupo de Trabajo de Osteoporosis de la Sociedad, José Antonio Blázquez.

Estudios cooperativos

A su juicio, el proyecto mejorará el conocimiento sobre esta patología en la práctica clínica habitual en Medicina Interna. Dicho registro, en opinión del especialista, puede ser una herramienta de utilidad para llevar a cabo estudios cooperativos sobre cualquiera de los tipos de variables incluidas en la base de datos, acerca de los factores de riesgo de la osteoporosis y fracturas, osteoporosis secundarias, utilidad de pruebas diagnósticas eficacia y efectos adversos de los diferentes tratamientos.

Según los datos de la Sociedad Española de Medicina Interna, en España se producen cada año en torno a 350.000 fracturas osteoporóticas, de las que cerca de dos tercios responden a fracturas vertebrales, de cadera y muñeca.

La osteoporosis es un trastorno que produce una disminución de la resistencia ósea, lo que incrementa el riesgo de fracturas debido a la fragilidad de los huesos. Los especialistas advierten de que la fractura de cadera requiere especial atención, ya que «es un problema de salud creciente debido al envejecimiento de la población».

La repercusión se considera impotante. La fractura vertebral es la más frecuente, aunque en ocasiones no se diagnostica.

1 de 1 23/04/2009 9:30