

PUBLICIDAD



Miércoles, 08 de mayo de 2013



Busca

Opinión | Personajes | Primera Persona | Autonomías | Multimedia | Actualidad Gráfica | Entrevistas | A Fondo | Medicamentos

Pacientes | Médicos | Farmacias | Tecnología | Industria | Cardiología | Pediatría | Oncología | Cirugía | Salud Hombre | Salud Mujer | Nutrición | Estética | Vida Sana | Biotecnología

PUBLICIDAD

Las intervenciones quirúrgicas o el cáncer aumentan el riesgo de tromboembolismos

08-05-2013

comentarios 0



Redacción | Madrid

El cáncer, las intervenciones quirúrgicas y la inmovilización aumentan el riesgo de padecer un tromboembolismo, advierten expertos en el marco del IX Fórum Multidisciplinar de la Enfermedad Tromboembólica (ETV) organizado por la **Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)**.

Y es que la principal característica que diferencia a hombres y mujeres es que, estas últimas, están expuestas a unos factores exclusivos como son la toma de anticonceptivos y los embarazos.


Otra de las causas que pueden aumentar el riesgo de sufrir esta patología es la trombofilia, que consiste en alteraciones, la mayoría de las veces, hereditarias o adquiridas, por lo que será otro de los aspectos que abordarán los expertos reunidos en el encuentro.

En España se estima que cada año se producen unos 150.000 casos de ETV, patología que puede ponerse de manifiesto como una trombosis venosa profunda o como una embolia pulmonar, coágulo de sangre que se forma en las venas de las piernas y que se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hasta las arterias pulmonares.

Durante la cita, se actualizarán las últimas novedades del abordaje de estos pacientes y se analizarán las indicaciones del tratamiento a domicilio, que resulta beneficioso en doble medida, ha señalado el **doctor Ferrán García-Bragado, coordinador del Grupo de Tromboembolismo de la SEMI**.

Por un lado, para el paciente, ya que el tratamiento puede seguirse en su domicilio con mayor confort, satisfacción y calidad de vida con igual eficacia y seguridad; y por otra parte, para el sistema sanitario (en términos económicos), ya que la hospitalización es con diferencia la parte más costosa de la atención del tromboembolismo, ha argumentado.

Aunque no es posible realizar el tratamiento a domicilio en todos los casos, ha matizado este experto, al tiempo que ha concretado que es necesario que se cumplan una serie de requisitos mínimos como que el paciente tenga apoyo, garantías de que cumpla el



Últimas Noticias Más Noticias Más Vistas

Twitter

Facebook

VIDEO



tratamiento, que tenga un escaso riesgo de presentar complicaciones a lo largo del tratamiento y preferiblemente con fácil acceso a dispositivos sanitarios por si hubiera complicaciones.

Porque salud necesitamos todos ConSalud.es
@ConSalud_es

Normas de uso

- Esta es la opinión de los internautas, no de www.consalud.es
- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
- www.consalud.es se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere fuera del tema

Deje su comentario



Nombre:

Mail:

Comentario:

Bulima

Comentarios # 0

Pacientes	Opinión	A Fondo	Salud de la Mujer	Biotecnología
Médicos	Personajes	Entrevistas	Salud del Hombre	Pediatría
Farmacias	Primera Persona	Actualidad Gráfica	Cirugía	Estética
Medicamentos	Industria	Multimedia	Oncología	Nutrición
Vida Sana	Tecnología	Autonomías	Cardiología	







ConSalud © Copyright 2013 - AVISO LEGAL - PUBLICIDAD - REDACCIÓN - DIRECCIÓN - WEBMASTER
 ConSalud - Paseo Santa María de la Cabeza 42 bis, Oficina 4, 28045 Madrid (España) - Tlf (34) 91 022 26 72 - info@consalud.es