Compartir

Recommend 0

Tweet

Herramientas

Valorar [0]

Imprimir

ESPECIALIZADA /

Un 0,5% de la población joven sufre osteoporosis densitométrica

Temas relacionados: SEMI · Pacientes · VIH · Trasplantes · Osteoporosis · Anemia · Menopausia

GACETA MÉDICA / BARCELONA

@GacetaMedicaCom

jueves, 06 de marzo de 2014 / 10:00

La mayoría de las pacientes con osteoporosis premenopáusica presentan una causa subyacente, como las enfermedades endocrinas, trastornos de la alimentación o síndromes de malabsorción, fármacos osteopenizantes, trasplantes, infecciones por VIH... según explica José Manuel Olmos Martínez, coordinador del Grupo de Trabajo de Osteoporosis de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Teniendo en cuenta estos condicionantes, este médico recuerda que alrededor del 0,5 por ciento de la población joven tiene una osteoporosis densitométrica, si bien uno de los problemas que plantea la osteoporosis en mujeres antes de la menopausia es que no existen unos criterios definidos.

Como se ha puesto de manifiesto durante la X Reunión de Osteoporosis de la SEMI, suele aceptarse el diagnóstico de osteoporosis cuando se dan fracturas por fragilidad o alguna causa subyacente. Sin embargo, también se ha propuesto que podría diagnosticarse cuando la densidad mineral ósea se encuentra por debajo de dos desviaciones estándar de la media de las mujeres de su misma edad.

Entre los proyectos de futuro del Grupo de Osteoporosis de la SEMI está potenciar la plataforma Osteomed que recopila los datos de pacientes de toda España y que tiene como fin conocer el perfil del paciente con osteoporosis y su manejo en Medicina Interna, así como los problemas en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento y desarrollar, dentro de ella, un Registro Nacional sobre fracturas atípicas de fémur, para conocer las características y la verdadera relevancia de este problema.

Además, están llevando a cabo, en colaboración con el Grupo de Enfermedades Minoritarias de la SEMI, el Estudio Degaus, para la detección de la Enfermedad de Gaucher en pacientes con anemia o trombopenia y con osteopenia u osteoporosis.

Comentarios de esta Noticia

Para poder comentar una noticia es necesario estar registrado.
Regístrese o acceda con su cuenta.

Lo GM

Publicidad

Suplementos y Especiales

Farmacia HOSPITALARIA

RSC SECTOR SALUD Responsabilidad Social Corporativa

BiC Premios Best In Class

Twitter

Tweets sobre "gacetamedica"

Contenidos