

CONSEJOS

DE TU FARMACÉUTICO

La revista que te regala tu farmacéutico

SALUD Y ENFERMEDAD VIDA SANA NUTRICIÓN BELLEZA PSICO EMBARAZO NIÑOS

Últimas revistas
Dónde encontrarlos

Para el farmacéutico

Home > Salud y enfermedad > Actualidad Salud y Enfermedad > Una de cada cuatro mujeres y uno de cada diez hombres españoles mayores de 50 años padece osteoporosis


Una de cada cuatro mujeres y uno de cada diez hombres españoles mayores de 50 años padece osteoporosis

Publicado por consejos el 06/03/2014

Tweet

Pin It

Una de cada cuatro mujeres y uno de cada diez hombres españoles mayores de 50 años padece osteoporosis, una enfermedad crónica que causa en España alrededor de 45.000 fracturas de cadera al año (unas 120 al día) y más de 100.00 fracturas vertebrales. Tanto es así que se calcula que una de cada tres mujeres españolas mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica a lo largo de su vida.



Uno de sus principales peligros es que se trata, según el doctor José Manuel Olmos

Martínez, coordinador del Grupo de Trabajo de Osteoporosis de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), de una epidemia silenciosa. Según este experto, hay que tener en cuenta que la osteoporosis puede ser asintomática, fundamentalmente por dos razones: que no se hayan dado fracturas o que se hayan producido fracturas vertebrales indoloras (dos de cada tres son de este tipo).

Así lo señala en el marco de la X Reunión de Osteoporosis de la SEMI que se celebra en Madrid con la presencia de más de 100 especialistas, entre cuyos objetivos están actualizar los conocimientos acerca del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en mujeres premenopáusicas, analizar las próximas novedades terapéuticas y poner al día los resultados de los estudios multicéntricos que está llevando a cabo el Grupo de Trabajo de la SEMI.

La osteoporosis premenopáusica, una patología difícil de diagnosticar

Uno de los problemas que plantea la osteoporosis en mujeres antes de la menopausia es que no existen unos criterios densitométricos definidos, algo que sí ocurre tras la menopausia. Según el doctor Olmos Martínez, suele aceptarse el diagnóstico de osteoporosis cuando se dan fracturas por fragilidad o alguna causa subyacente; sin embargo, también se ha propuesto que podría diagnosticarse cuando la densidad mineral ósea se encuentra por debajo de dos desviaciones estándar de la media de las mujeres de su misma edad. Hay que tener en cuenta la existencia de otros factores de riesgo como las fracturas por fragilidad, ciertas enfermedades y la administración de algunos fármacos que son perjudiciales para el esqueleto, recuerda.

De hecho, según este especialista, la mayoría de las pacientes con osteoporosis premenopáusica presentan una causa subyacente, como las enfermedades endocrinas, trastornos de la alimentación o síndromes de malabsorción, fármacos osteopenizantes, trasplantes, infecciones por VIH, etc.. Teniendo en cuenta estos condicionantes, este médico

f t r Buscar

Suscríbete a nuestra newsletter

ACTUALIDAD:



El 40% de las víctimas de incendios son mayores de 65 años

Los accidentes, en general, tienen un impacto muy considerable en la salud de las...

marzo 6, 2014 0



La no inclusión de la vacuna antineumocócica en el calendario deja a España en clara desventaja con Europa

El principal reto del abordaje de la enfermedad neumocócica en la actualidad es tratar...

marzo 6, 2014 0



Identifican la sal como una droga tan adictiva como la cocaína

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) alerta de que la sal ya puede considerarse...

marzo 6, 2014 0

VER MÁS

ENCUESTA DEL MES

¿Estás de acuerdo con que el Gobierno eleve la edad mínima de consentimiento sexual de 13 a 16 años?

Sí
 No

Vote

Ver resultados

recuerda que **alrededor del 0,5% de la población joven tiene una osteoporosis densitométrica.**

Proyectos del Grupo de Osteoporosis de la SEMI

Entre los **proyectos de futuro del Grupo de Osteoporosis de la SEMI** está **potenciar la plataforma Osteomed**, que recopila los datos de pacientes de toda España y que tiene como fin conocer el perfil del paciente con osteoporosis y su manejo en Medicina Interna, así como los problemas en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y desarrollar, dentro de ella, un Registro Nacional sobre fracturas atípicas de fémur, para conocer las características y la verdadera relevancia de este problema.

Asimismo, el Grupo está llevando a cabo, **en colaboración con el Grupo de Enfermedades Minoritarias de la SEMI, el Estudio DEGAUS (Estudio de detección de la Enfermedad de Gaucher en pacientes con anemia o trombopenia y con osteopenia u osteoporosis)** y ha puesto en marcha un protocolo de investigación para valorar la evolución clínica, analítica y densitométrica de los pacientes a los que se les retira el tratamiento con bisfosfonatos.

Finalmente, este Grupo ha llevado a cabo recientemente un **estudio para conocer las tasas de incidencia de fractura de cadera en las comunidades de Castilla y León y Cantabria, cuyos resultados definitivos están pendientes de publicar.**

osteoporosis SEMI

Tweet

Pin It

ARTÍCULOS RELACIONADOS



DEJA UN COMENTARIO

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Comentario

Publicar coment