

[Suscríbese a las Novedades](#) | [Leer el último boletín de Novedades](#)

INICIO

[Portada](#) | [Buscar](#) | [Revista](#) | [Casos Clínicos](#) | [Artículos](#) | [Imágenes](#) | [Diapositivas](#) | [Apuntes](#) | [Especialidades](#) | [Videos](#) | [Cursos](#) | [Congresos](#) | [Diccionario Médico](#) | [Exámenes: MIR FIR PIR RIR](#)

[Últimas Noticias](#) | [Últimas Publicaciones](#) | [Revista Médica](#) | [Foros de Debate](#) | [Empleo](#) | [Enlaces](#) | [Intercambio de Banners](#) | [Blogs](#) | [WIS](#) | [MedBook](#) | [Seguros Médicos](#)

NoticiasMedicas

Todas las noticias de la actualidad médica y sanitaria

[ÚLTIMAS NOTICIAS MÉDICAS](#) | [CONTACTO](#) | [ARCHIVO DE NOTICIAS MÉDICAS](#) | [REVISTA PORTALESMEDICOS.COM](#) | [SUSCRIPCIÓN GRATUITA](#)

BUSCAR NOTICIAS

ENLACES

TEMAS

abbott Astra-Zeneca
 boehringer
 ingelheim cecova
 centros de salud
 ciencias de la salud
 CI colegio oficial Comunidad
 Valenciana Congreso
 internacional
 congreso
 nacional
 departamento de salud
 diabetes El
 Hospital
 enfermedades
 cardiovasculares
 enfermedades infecciosas
 enfermedades
 neurodegenerativas
 Enfermedades raras
 fraternidad muprespa HM
 HM Hospitales hospital
 la paz hospital san
 juan de dios
 Hospital
 Universitario
 hospital universitario
 de bellvitge hospital
 universitario La Paz la
 Comunidad de
 Madrid la
 enfermedad de
 Alzheimer La
 Sociedad Madrid
 Mancha Centro
 medicina interna
 ministerio de
 sanidad ola OS
 personas mayores
 PSN salud mental san

Entre el 15% y el 20% de las personas con inflamación del hígado por causa del alcohol desarrolla hepatitis o cirrosis

28 abril, 2014

Si te resulta de interés, comparte en tu red social:



Entre el 15% y el 20% de las personas con inflamación del hígado por causa del alcohol desarrolla hepatitis o cirrosis

Madrid acoge la III Jornada sobre Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de [Medicina Interna](#) (SEMI)

- Los daños causados por el consumo de alcohol dependen de muchos factores: además de la cantidad, también influyen el sexo, determinantes genéticos o las infecciones
- Se estima que alrededor del 5% de la población de entre 15 y 64 años puede ser bebedora de riesgo
- El Grupo de Alcohol y Alcoholismo de la SEMI está llevando a cabo un estudio sobre el [síndrome](#) de abstinencia alcohólica en pacientes hospitalizados y otro sobre las personas que han recibido tratamiento por un trastorno producido por alcohol

Madrid, abril de 2014.- La gravedad de los daños que ocasiona el consumo de alcohol depende de muchos factores; además de la cantidad que se bebe, también influyen el sexo, los determinantes genéticos o las infecciones.

Uno de los daños más comunes son las inflamaciones del hígado. Según el **doctor Antonio J. Chamorro, coordinador del Grupo de Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)**, en la hepatopatía alcohólica (la inflamación del hígado a causa del alcohol), que es probablemente la complicación más estudiada, se sabe que aproximadamente un 15-20% de los pacientes desarrollan formas graves de la [enfermedad](#) (hepatitis alcohólica o cirrosis). Podríamos decir que los principales órganos afectados por el consumo crónico de alcohol son el hígado, el sistema nervioso (cerebro y nervios) y el corazón; en todos ellos, la inflamación juega un papel muy importante en el desarrollo del daño ligado al consumo.

Así lo asegura este experto en el marco de la III Jornada sobre Alcohol y Alcoholismo celebrada en Madrid, y que repasa los temas que centran la atención de la investigación biomédica en este campo, como los mecanismos que producen la adicción en estos pacientes y el desarrollo de nuevas

VIDEOS

SUSCRIPCIÓN GRATUITA

Introduce tu e-mail para recibir los titulares más recientes:

Servicio ofrecido por FeedBumer

ÚLTIMAS NOTICIAS

- Los Premios Albert J. Jovell promoverán y potenciarán la innovación sanitaria 28 abril, 2014
- La sanidad pública sigue siendo la principal salida tras la residencia en Reumatología 28 abril, 2014
- En el marco del Día Mundial del Trabajo 1 de

Carlos sanitas
residencial sant joan
sistema nacional de salud
universidad de barcelona
universidad de
navarra VIH



ARCHIVOS

- abril 2014
- marzo 2014
- febrero 2014
- enero 2014
- diciembre 2013
- noviembre 2013
- octubre 2013
- septiembre 2013
- agosto 2013
- julio 2013
- junio 2013
- mayo 2013
- abril 2013

SÍGUENOS



FACEBOOK

moleculas que ayudan a mantener la abstinencia y a mejorar o curar las [enfermedades](#) orgánicas asociadas, en particular la hepatitis alcohólica.

Por otra parte, indica este experto, se continúa estudiando por qué algunas personas que consumen alcohol de forma crónica desarrollan adicción al alcohol o determinadas complicaciones, como el daño hepático, y otros no. También en los últimos años se han desarrollado nuevas vías de investigación en relación con el daño neuronal y concretamente la neuroinflamación producida por el alcohol, de gran importancia dado que está asociada con el consumo intensivo de alcohol o botellón.

El consumo de alcohol se estabiliza en España

Según los datos de la última Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) que realiza el Plan Nacional sobre Drogas cada dos años en la población de entre 15 y 65 años, el alcohol sigue siendo la droga más consumida en nuestro país (el 76% dice haberlo consumido en el último año) y el inicio de consumo se sitúa de media en los 16,7 años de edad.

La tendencia, señala el Dr. Chamorro, se encuentra estabilizada en los últimos 10 años. Sin embargo, el tipo de consumo ha cambiado, pasando de un consumo mediterráneo (diario en poca cantidad) a uno anglosajón, en atracón o *binge drinking* durante los fines de semana. En ese sentido, se estima que alrededor del 5% de la población entre 15 y 64 años puede ser bebedora de riesgo por la cantidad de alcohol que consume. Además, según esta encuesta, un 41,3% de los hombres y un 23,5% de las mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 34 años se habían emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses.

La SEMI estudia el síndrome de abstinencia en pacientes hospitalizados

Durante la Jornada se exponen los resultados preliminares de un estudio prospectivo que el Grupo de Alcohol y Alcoholismo de la SEMI está llevando a cabo sobre el síndrome de abstinencia alcohólica de pacientes hospitalizados, en el que están participando 11 hospitales de toda España, y otro sobre pacientes que han recibido tratamiento por un trastorno producido por el consumo de alcohol.

Artículos relacionados con: Entre el 15% y el 20% de las personas con inflamación del hígado por causa del alcohol desarrolla hepatitis o cirrosis

- [Entre el 15-20% de las personas que acuden a Atención Primaria en La Ribera presentan un consumo de alcohol considerado de riesgo](#)

Entre el 15-20% de las personas que acuden a Atención Primaria en La Ribera presentan un consumo de alcohol considerado de riesgo. El viernes se ...

- [La detección de problemas con el consumo abusivo de alcohol durante el ingreso es fundamental para cambiar la conducta y mejorar el pronóstico](#)

La detección de problemas con el consumo abusivo de alcohol durante el ingreso es fundamental para cambiar la conducta y mejorar el pronóstico. El 3% ...

- [Aumentan los problemas de disfunción eréctil entre los jóvenes de 18 a 25 años](#)

Aumentan los problemas de disfunción eréctil entre los jóvenes de 18 a 25 años. En casi el 10% de los casos tratados por Boston Medical ...

- [La hepatitis alcohólica es una enfermedad grave y de alta mortalidad precoz](#)

La hepatitis alcohólica es una enfermedad grave y de alta mortalidad precoz. La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) alerta sobre la gravedad de los ...

En un estudio con esta muestra se ha visto que cada 10 pacientes con psoriasis ha tenido que abandonar su puesto de trabajo o ha sido despedido por su enfermedad 28 abril, 2014

- [Chiesi España lanza la página web del medicamento antiinflamatorio Flogoprofen dirigida a ciudadanos y profesionales sanitarios](#) 28 abril, 2014
- [Expertos en cirugía de la mama debaten sobre la eficacia de los programas de detección precoz en cáncer de mama en el III Congreso AECIMA](#) 28 abril, 2014
- [Entre el 15% y el 20% de las personas con inflamación del hígado por causa del alcohol desarrolla hepatitis o cirrosis](#) 28 abril, 2014
- [Myriad Genetics va de la mano de la FDA para la comercialización de BRACAnalysis como prueba diagnóstica](#) 28 abril, 2014
- [El Hospital de Puertollano lleva a cabo con éxito su primera extracción de órganos](#) 28 abril, 2014
- [Veletri es una nueva formulación de epoprostenol inyectable que aporta a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar grave una mayor flexibilidad y comodidad en su día a día](#) 28 abril, 2014
- [Más de 100 profesionales del sector farmacéutico gallego, reunidos en Santiago de Compostela](#) 28 abril, 2014

NOTICIAS POR FECHA

ABRIL 2014

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

« mar

TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS: