



[Portada](#)
[EcoDiario](#)
[EcoTeve](#)
[EcoMotor](#)
[EcoAula](#)
[Ecoley](#)
[Evasión](#)
[EcoTrader](#)
[eIMonitor](#)
[Ecopymes](#)
[América](#)

¿Usuario de eEconomista? [Conéctate](#)

eEconomista.es

España

Viernes, 21 de Noviembre de 2014 Actualizado a las 18:29

Noticias, acciones. Buscar

Portada Mercados y Cotizaciones Empresas Economía Tecnología Vivienda Opinión/Blogs Autonomías Servicios Diario y Revistas

Actualidad EcoDiario GLOBAL ESPAÑA DEPORTES MEDIO AMBIENTE CULTURA Programación TV Blogs Cartelem El tiempo Videos Apuestas

Vote a la mejor empresa de su sector 2014 eEconomista.es

Destacamos
Mourinho a Ramos: "Sácate un máster de medicina antes de hablar de mis jugadores"

El alcohol es la droga más consumida en España y sobre la que se tiene menos percepción del riesgo

[Twittear](#)

21/11/2014 - 18:29

Puntúa la noticia:
1
5
10
 Nota de los usuarios: - (0 votos)

Más noticias sobre: España Medicina Murcia

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que se celebra en Murcia del 19 al 21 de noviembre

MURCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El alcohol es la droga más consumida en España y es, de entre todas, sobre la que se tiene menos percepción de riesgo sobre la salud, según se desprende de la última Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES 2011-2012).

Así, en dicha encuesta se pone de manifiesto que el 62 por ciento de la población había consumido alcohol en los últimos 30 días y que el 42 por ciento de los hombres y el 23 por ciento de las mujeres entre 15 y 34 años se habían emborrachado en el último año.

El consumo de riesgo de alcohol y, por tanto, la dependencia alcohólica, se asocian al riesgo de desarrollar múltiples enfermedades, entre ellas hepáticas (cirrosis), cardíacas (miocardiopatía), mentales (depresión, demencia) o diversos cánceres (hígado, boca, esófago).

Por otra parte, constituye un factor bien conocido determinante de violencia familiar y de género, accidentes laborales y de circulación. Por ello, en el marco del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que se celebra del 19 al 21 de noviembre en Murcia, los expertos reunidos avanzarán en el abordaje de estos pacientes y las estrategias a implementar para su prevención y tratamiento.

Enlaces relacionados

La madre del niño hallado muerto en Oviedo y su pareja declaran en Comisaría (12/11)

Declaran ante el juez los concejales imputados del PP de Utrera y PSOE e IU piden su dimisión (22/10)

[Seguir a @elecodiario](#)

El flash: toda la última hora

Bolsas

Facturar la luz por horas: Competencia pide que el sistema arranq...

13.40 eEconomista.es · Empresas y finanzas

Vote a la mejor empresa de su sector 2014

El serbio Mazic dirigirá el Basilea-Madrid del miércoles



El doctor Rafael Monte, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo y ponente en el Congreso, ha indicado que "es especialmente preocupante el patrón de consumo de grandes cantidades de alcohol en periodos cortos de tiempo entre los adolescentes, tanto en hombres (23%) como en mujeres (20%)".

Además, subraya que "el inicio del consumo de alcohol durante la adolescencia, que en España se sitúa en los 16 años, se asocia a un mayor riesgo de sufrir sus consecuencias negativas sobre la salud en la vida adulta, incluyendo la dependencia del alcohol".

Cuando el consumo de alcohol adquiere la máxima prioridad para el individuo, por encima de otros comportamientos, hablamos de dependencia alcohólica. "Esta condición requiere una valoración médica para su diagnóstico y es difícil de recoger en las encuestas sobre consumo de drogas, por lo que no existen datos recientes fiables sobre su prevalencia en España", señala Monte Secades.

Y es que, aunque algunas personas pueden dejar el alcohol por sus propios medios, muchos necesitarán ayuda especializada. Sin embargo, se calcula que menos del 10 por ciento de los afectados por dependencia alcohólica reciben tratamiento en España.

Entre los que han recibido tratamiento, aproximadamente un 70 por ciento presentan reducción del número de días de consumo y una mejoría de la salud percibida a los seis meses, aunque las recaídas son frecuentes. A largo plazo, alrededor de un 45 por ciento se mantienen en remisión diez años después de iniciado el tratamiento.

Como explica este experto, "la dependencia del alcohol se caracteriza por una gran variabilidad individual entre los afectados. Existe, probablemente, un defecto de base en el funcionamiento de determinados circuitos cerebrales que intervienen en el autocontrol de la conducta de beber bebidas alcohólicas, sobre el que se suman múltiples factores genéticos, ambientales, psíquicos, sociales y biológicos que se interrelacionan entre sí, lo que hace difícil establecer un perfil típico".

SÍNDROME DE ABSTINENCIA ALCOHÓLICA

Por su parte, el síndrome de abstinencia alcohólica -que consiste en la expresión clínica de la interrupción brusca de la ingesta de alcohol en una persona con dependencia del mismo- puede producirse de forma involuntaria debido a enfermedades o lesiones, intencionada tras una abstinencia voluntaria forzada, o durante el curso de una desintoxicación programada.

Tal y como exponen los expertos en la mesa 'Síndrome de abstinencia y dependencia alcohólica', en el marco del Congreso Nacional de la SEMI, este se manifiesta tras 6-24 horas de abstinencia, en forma de temblor, sudoración e inquietud.

Algunos enfermos presentarán alucinaciones y/o crisis epilépticas. Además, alrededor de un 5-10 por ciento evolucionará hacia delirium tremens, con alucinaciones, confusión y agitación graves.

Su abordaje y tratamiento se realiza habitualmente en el entorno hospitalario. Los objetivos generales de tratamiento son controlar los síntomas, prevenir las crisis epilépticas y evitar la progresión a delirium tremens.

Por otra parte, es necesario valorar y corregir en su caso las necesidades de aporte de líquidos durante el episodio, así como las alteraciones analíticas o vitamínicas que pueden complicar su evolución.

Los enfermos con síndrome de abstinencia alcohólica, además de tratamiento sedante, necesitan de una valoración multidisciplinar que tenga en cuenta la presencia de otras comorbilidades, relacionadas o no con el alcoholismo, y de las complicaciones que pueden aparecer durante su evolución. Por este motivo, el internista suele atender los casos de síndrome de abstinencia alcohólica ingresados en un hospital general.

El internista se encarga además en el entorno ambulatorio de la valoración y tratamiento de la repercusión orgánica del alcohol en el paciente, colaborando con las Unidades de Tratamiento del Alcoholismo en el control de la abstinencia.



eEconomista EcoDinero EcoTeve Motor Evasión

Noticias más leídas

1. El Ibex 35 sube más del 1% y supera los 10.600 puntos
2. El FT se lamenta de que Podemos sea el único que plantee la ...
3. Pedro J. Ramírez: "0 Unidad Editorial publica mi carta o me ...
4. Telefónica, en negociaciones para vender su operador O2 a Br...
5. Amazon se adelanta al Black Friday y lanza una semana comple...

Más noticias

Noticias más leídas

1. El Gobierno de Rajoy estudia la posibilidad de trasladar el ...
2. El Real Madrid ata los fichajes de Asensio y Peeters y esper...
3. Tania Sánchez (IU) pudo comenzar su carrera política como as...
4. Podemos ganaría hoy las elecciones generales, según un nuevo...
5. Detenidos cuatro sacerdotes por su relación con los casos de...

Más noticias

Noticias más leídas

1. Gran bronca entre Belén Rodríguez y el 'clan de Carabanchel'...
2. Detenido un profesor zamorano por 'cocinar' droga como Walte...
3. Jesús Bonilla, 'El Langui', Dafne Fernández y Adrián Rodrig...
4. Prisa busca en México refrotar sus cuentas
5. Manolo Lama: "Zidane nunca ha estado a la altura de Cristian...

Más noticias

Noticias más leídas

1. Quant e-Sportlimousine, el deportivo que funciona con agua d...
2. ¿Cuántos partes hay que dar al año



Tratamiento del Alcoholicismo en el control de la adicción.

Para Monte Secades, sería conveniente aumentar el grado de alerta por parte del personal sanitario en la detección de bebedores de riesgo, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria de Salud.

"Esto permitiría realizar intervenciones estructuradas encaminadas al descenso en el consumo. En el ambiente hospitalario también es necesario identificar adecuadamente a los enfermos con dependencia de alcohol y, por tanto, con riesgo de desarrollar un síndrome de abstinencia al cesar en su consumo, por ejemplo durante el curso de un ingreso por otro motivo. Estos enfermos pueden beneficiarse de la aplicación de medidas preventivas de vigilancia y tratamiento", concluye.

España

menéame | del.icio.us | enviar | imprimir | twitter | facebook

Haga doble click sobre una palabra para conocer su significado

Twitter

para rentabilizar un segu...

3. Siemens lanza un autobús híbrido que se recarga en 6 minutos...
4. La pequeña Honda de los 600 kilómetros de autonomía
5. El Gobierno rebajará peajes de autopistas durante las horas ...

Más noticias

Noticias más leídas

1. Hiba Abouk revoluciona Twitter con su nueva foto de perfil
2. Fernando Tejero muy preocupado por Eugenia Martínez de Irujo...
3. Sean O'Pry, la última víctima de las locuras de Taylor Swift...
4. Así es Nicole Scherzinger, la reina de la Fórmula 1
5. Terelu, Natalia y Ana Polvorosa muy animadas en el concierto...

Más noticias

Warning: Problema al devolver el XSL. En el modulo: 5059, en la edicion: 152 in /home/files/php_Class/lib/Modulo.php on line 475



El hijo de Peté vuelve a la cárcel por su nexa con la red de blanqueo de dinero y narcotráfico

Más noticias de América



EcoDiario en Facebook

eD EcoDiario.es
M'agrada

A 14.260 personas els agrada EcoDiario.es.