III Forum de la ETEV. Gerona 22-24 de marzo de 2007

Dr. Javier Gutiérrez Guisado
Servicio Medicina Interna
Hospital Asepeyo Coslada (Madrid)

Introducción

- No existen recomendaciones específicas acerca de la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con lesiones aisladas de las extremidades inferiores.
- [Geerts et al. Chest 2004; 126:338S-400S.](#)

Estudios ambulatorios inmovilización

EEII y ETEV

	<i>Jorgensen (2002)</i>	<i>Kock (1995)</i>	<i>Spannagel (1993)</i>
HBPM	Tinzaparina 3500 UI	3000 UI	3600 UI
Inmovilización (d)	45	15.2	15.6
TVP (d)	-	11.4	17.1
Incidencia TVP (%)	10/17	0/4.3	4.8/16
Dx TVP	Flebo	US	US

Jorgensen PS, et al. Low Molecular weight heparin (innohep) as thromboprophylaxis in outpatients with a plaster cast: a venographic controlled study. *Thromb Res* 2002; 105:477-480

Kock et al. Thromboprophylaxis with low-molecular-weight heparin in outpatients with plaster -cast immobilisation of the leg. *Lancet* 1995; 346:459-461.

Spannagel et al. Incidence and prophylaxis of deep venous thrombosis in outpatients with injury of the lower limb. *Haemostasis* 1993; 23 (suppl 1):20-26.

Objetivos

- Describir las características clínicas de los casos de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con traumatismos menores de la extremidad inferior estudiados en nuestro centro.
- Analizar en estos casos la existencia de trombofilia.
- Establecer recomendaciones en cuanto a la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en los traumatismos menores de la extremidad inferior.

Material y Métodos

- **Inclusión de pacientes con traumatismos menores de la extremidad inferior, atendidos en nuestro centro entre Marzo de 2001 y Septiembre de 2006, que habían sido tratados con inmovilización (sin cirugía) y que habían desarrollado enfermedad tromboembólica venosa.**

Resultados

- 28 pacientes ETEV
- Edad 36 años
- Peso 76,9Kg; IMC 25,82.
- 25 varones
- **Traumatismo más común:** esguince tobillo(12); fractura dedo pie (6).
- **Tiempo inmovilización :** 17 días
- **Tiempo TVP:** 35 días
- **Varices:** 5 pacientes (17,85%)

Resultados: ETEV

- 20 TVP proximales (71,42 %)
- 7 TVP distales (25 %)
- 2 TEP
- 14 profilaxis:
 - 9 TVP proximal (64%)
 - 5 TVP distal (35%)
- 14 sin profilaxis:
 - 11 TVP proximal (85%)
 - 2 TVP distal
 - 1 TEP

Resultados: ETEV

- TVP proximales y TEP recibieron tto con ACO (3 y 6 meses respectivamente)
- 1 caso TVP proximal recibió HBPM 3 meses
- TVP distales:
 - ACO: 5 casos
 - HBPM: 2 casos

Resultados:trombofilia

- 19 pacientes con estudio trombofilia:
 - antitrombina III, prot S, prot C, AAF, FV Leiden, Gen Protrombina, Homocisteína.
- 14 fue positivo (73%):
 - La alteración más común: Prot S, AAF, F V Leiden.

ETE V y Trombofilia

Trombofilia	TVP proximal	TVP distal	TEP
Positiva	9	4	1
Negativa	6	0	0
No realizada	5	3	0

Resultados : complicaciones

- Síndrome Postrombótico: 9 pacientes (32%).

Discusión

- Estudio observacional: no establece incidencia.
- Traumatismos menores son un factor de riesgo para ETEV.
- 12 casos esguince tobillo: 8 la TVP fue proximal.
- Tempo:
 - 17 días inmovilización
 - 35 días TVP.

Discusión

- Las HBPM no consiguen reducir el riesgo de forma total
- En nuestro estudio, 14 casos con profilaxis:
 - 9 TVP proximal
 - 5 TVP distal
- Estudio trombofilia (14/19):
 - positiva en 5 pacientes con profilaxis

Discusión

- Los factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con traumatismos menores de la extremidad inferior son, además de la **inmovilización**, una **edad superior a los 40 años**, el **sobrepeso** y la **presencia de venas varicosas en los miembros inferiores** .
 - Kock et al. Lancet 1995;346:451-461
 - Kujath et al. Haemostasis 1993; 23S:20-21.

Discusión

- En nuestro estudio estos FR no son relevantes
- Trombofilia: 73%
- Proporción muy superior a la descrita en la literatura (1-25%)
- La trombofilia es un FR en nuestro estudio
- La presencia de trombofilia determina el tiempo de ACO

Discusión

- En base a los resultados de nuestro estudio, nosotros recomendamos la administración de profilaxis con HBPM de forma sistemática a todos los pacientes con traumatismos menores de la extremidad inferior tratados mediante inmovilización

Discusión

- Realizar un estudio de trombofilia en todos aquellos pacientes que, a pesar de la profilaxis con HBPM, desarrollen enfermedad tromboembólica venosa

Conclusiones

- Los traumatismos menores de la extremidad inferior tratados de forma conservadora (inmovilización, sin cirugía) constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa.
- En este tipo de traumatismos, es aconsejable utilizar profilaxis con HBPM de forma sistemática y mantenerla hasta que el paciente deambule con normalidad. Puede no ser eficaz.
- Recomendamos realizar Trombofilia.

Futuro

- RIETE:
 - grupo investigación consolidado
 - describe situaciones reales
 - entusiasmo de sus miembros