

IV Forum Multidisciplinar de la Enfermedad Tromboembólica

(Elche, 8-9 Mayo 2008)

**Profilaxis ETV en el anciano:
¿lo hacemos bien?**


Dra. B. Vasco

Servicio Hematología

Hospital Virxe da Xunqueira (Cee- La Coruña)

¿qué entendemos por anciano?

**EDAD AVANZADA
> 65 AÑOS**



**EDAD MUY AVANZADA
> 80 AÑOS**

SEGG

¿ porque es necesaria la profilaxis ETEV en el anciano?

- Edad FR para ETEV (\uparrow exponencial riesgo a partir de los 65 años)
- % población europea $>$ 65 años pasará del 16% en el 2000, al 22% en el 2025
- ETEV problema médico importante (riesgos a corto y largo plazo) y frecuente (10% causas muerte en necropias hospitalarias por TEP)
- Profilaxis efectiva en evitar aparición y consecuencias

¿ porque es necesaria la profilaxis ETEV en el anciano?

Pronóstico empeora con la edad

Coste económico

Problemas dx

Comorbilidad asociada



Sangran más con ttos


Estrecho margen terapéutico fármacos


Exclusión ensayos clinicos

21.411 pacientes (Registro Riete)

- ETEV diagnosticada por medios objetivos
- seguimiento mínimo 3 meses








Factores Riesgo Asociados	< 65 años	65-80 años	> 80 años
Post-cirugía	15%	12%	7.3%
Inmovilidad \geq 4 días	20%	23%	34%
Cáncer	19%	24%	18%
ETEV previa	15%	17%	15%
Idiopática	42%	47%	46%


FR: CIRUGIA	< 65 años	65-80 años	> 80 años
EDEV Post-cirugía Total	15%	12%	7.3%
Cirugía ortopédica	-Mayor 8.3% -Otras 20%	-Mayor 32% -Otras 7.7%	-Mayor 52% -Otras 5.6%
Cirugía Oncológica	11%	17%	7.5%
Cirugía abdominal	16%	14%	9.8%
Otras	43%	29.2%	24.7%

FR: cirugía. Profilaxis




FR: INMOVILIDAD ≥ 4 Días	< 65 años	65-80 años	> 80 años
% ETEV Total	20%	23%	34%
Enfermedades mentales	3.1%	13%	27%
Infección aguda	13%	15%	15%
Parálisis MI	7.8%	8.8%	7.6%
Cardiop. isquémica	0.7%	2.2%	1.6%
Fallo cardíaco	1.1%	3.9%	6.4%
ACV	3.4%	5.2%	4.5%
Trauma sin cirugía	35%	14%	12%
Cáncer	8.2%	6.6%	2.5%
EPOC	2.2%	7%	4.7%
Artropatía	7.6%	9.1%	8.2%
Otros	18%	16%	10%


FR: Inmovilización. Profilaxis



% casos con profilaxis según FR



Lugar de inmovilización



- *Edad como FR*
- *Infrautilización profilaxis en pacientes de edad avanzada*
- *Extender profilaxis a procesos médicos*
- *Extender profilaxis al ámbito Atención Primaria - Domicilio*

