


Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid

IX

**Reunión de
Osteoporosis**

26 de Abril 2013



Reunión de osteoporosis

11:30-13:30 h MESA REDONDA I:
**DILEMAS EN EL TRATAMIENTO DE LA
OSTEOPOROSIS**

Moderadores: **Dr. José Filgueira Rubio**
Servicio de Medicina Interna
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Madrid

Dra. Begoña de Escalante Yangüela
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Ponentes: **¿A quién tratar?**

Dr. Bernardino Díaz López

Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

¿Cómo valorar la respuesta al tratamiento?

Dr. Xavier Nogués i Solán

Servicio de Medicina Interna
Hospital del Mar. Barcelona

Consecuencias de la retirada del tratamiento

Dr. Ramón Pérez Cano

Unidad de Metabolismo Óseo. Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

**¿Cuándo reintroducir el tratamiento y con qué
fármaco?**

Dr. José Luis Hernández Hernández

Departamento de Medicina Interna
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Osteoporosis posmenopáusica

≥ 2 fracturas

< 65 años, sin fx,
OP sólo en columna

Mayoría de enfermas

Raloxifeno
(o estándar)

Alendronato, risedronato
(estándar)

Respuesta
inadecuada

Otra preferencia
Mala tolerancia

TRPT
(o estándar)

Estroncio
Ibandronato
Raloxifeno, Etidronato, Calcitonina

La valoración de la respuesta terapéutica

- 1º.- Tener en cuenta las características del paciente
- 2º.- La aparición de nuevas fracturas
- 3º.- El descenso de los valores de DMO central superior al 2%

(Corresponde al mínimo cambio significativo)

Después de al menos un año de tratamiento

La presencia de 2º y/ó 3º se puede considerar como una respuesta inadecuada

La ausencia de 2º y 3º se considera como una respuesta adecuada