La dieta: un instrumento biomodulador del riesgo cardiovascular

Francisco Pérez Jiménez.

Catedrático y Jefe de Servicio de Medicina Interna

Hospital Universitario Reina Sofía. Universidad de Córdoba

FACTORES DE RIESGO

- Colesterol HDL
- Colesterol LDL
- Diabetes
- Hipertensión
- Consumo de tabaco

ESTUDIO INTERHEART

Yusuf S et al. Lancet. 2004;364:937-52

**El beneficio tradicional de la dieta
sobre la prevención cardiovascular
se adscribe a su acción sobre los
factores de riesgo y a inducir
pérdida de peso**

El beneficio tradicional de la dieta: efecto de la grasa sobre el colesterol plasmático al sustituir a los HCO

	HDL	LDL
SATURADA	↑	↑
POLI	↓	↓
TRANS	↓	↑
COLESTEROL	↑	↑
MONO	↑	↓

Estudio en 322 obesos durante 2 años con tres dietas. NEJM 2008; 359:229

El beneficio de la dieta es limitado. Estudio controlado, un año, en 180 mujeres y 197 hombres

Stefanick M et al. N Engl J Med 1998;339:12-20

Colesterol: la diana clásica de la dieta es muy impredecible

El poder preventivo de los nutrientes en la prevención cardiovascular: más allá de los factores de riesgo

P Libby. Nature Rev Cardiol. 2009; 6: 399

Mecanismos aterogénicos activados en el síndrome metabólico y la diabetes. Nature 2006. Luc Van Gaal.

La Dieta Mediterránea

UN NUEVO PARADIGMA: mas allá de los Factores de Riesgo y mas allá del peso

El concepto de la arteriosclerosis, como enfermedad inflamatoria

Oxidación de las LDL

Activación de factor de transcripción NFκB

Inducción de genes y producción de moléculas inflamatorias

Acúmulo de células en la pared

Hansson, G. K. N Engl J Med 2005;352:1685

Vías de señalización de la inflamación activadas por el estrés oxidativo. T Finkel. Nature 2000; 408:239

Las ROS pueden originarse fuera o dentro de la célula y activan distintos factores o mecanismos.

Algunos son factores de transcripción (HSF1, NFκB y p-53) y otras son vías reguladoras de esos factores a través de la fosforilación con consecuencias biológicas múltiples.

Activación de los mecanismos inflamatorios

Conciencia glutatión reducido/oxidado postprandial en la población del Lipgene tras la intervención dietética

75 pacientes con SM recibieron una sobrecarga aguda con la misma dieta que habían seguido durante 12 semanas, en un diseño aleatorizado.

Saturada ● Mediterránea ● HCO ● HCO+ n3 larga cadena ●

Efecto protector postprandial, sobre el estrés oxidativo, de una dieta mediterránea. Lipigene: Población de Córdoba.

75 pacientes con SM recibieron una sobrecarga aguda con la misma dieta que habían seguido durante 12 semanas, en un diseño aleatorizado.

Dieta A: Saturada. B: Mediterránea. C: HCO. D: HCO

NF- κ B y mRNA TNF- α en monocitos tras tres tipos de grasa. Bellido C. Am J Clin Nut 2004. Jiménez Y. Brit J Nut 2008

Incremento respecto al basal

Incremento respecto al basal

NF- κ B

mRNA TNF- α

Marcadores solubles inflamatorios e ingesta aguda tras dietas de diferente contenido y calidad grasa.

FJ Fuentes. Br J Nutr 2008; 100:159

sVCAM-1 (ng/ml) postprandiales

sICAM-1 (ng/ml) postprandiales

Expresión de la subunidad inhibidora de NF- κ B (I κ B- α) tras ingesta aguda de distintos tipos de grasa en células mononucleares de pacientes con SM

74 personas aleatorizadas a 4 dietas, con un test de sobrecarga postprandial tras cada dieta, una composición similar a la dieta basal. **HSFA**: High saturated fatty acid diet **HMUFA**: High monounsaturated fatty acid diet. **LFHCC**: Low-fat, high complex carbohydrate diet **LFHCC n-3**: Low-fat, high complex carbohydrate diet, with long chain n-3 PUFA

El endotelio: primera diana de la aterogénesis

Flujo braquial tras la ingesta aguda de grasa. Vogel. Am J Cardiol. 1997; 78:341.

Caída del flujo, medido por Eco doppler, y relación entre niveles de triglicéridos y flujo arterial. 10 sanos recibieron dos desayunos con 50 gr y 0 gr de grasa

Función endotelial tras la ingesta aguda de diferentes tipos de grasa. FJ Fuentes. Br J Nutr 2008; 100:159

Efecto postprandial de una dieta mediterránea sobre la biodisponibilidad de óxido nítrico y sobre ICAM. Lipigene: Población de Córdoba.

75 pacientes con SM recibieron una sobrecarga aguda con la misma dieta que habían seguido durante 12 semanas, en un diseño aleatorizado.

Dieta A: Saturada. B: Mediterránea. C: HCO. D: HCO

Fisuración y trombosis de la placa

Factores hemostáticos tras tres desayunos con diferente calidad de grasa. J Delgado. Am J Clin Nut 2008

FIGURE 1. Mean ($\pm$ SE) postprandial changes from fasting in factor VIIc (FVIIc) and plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) after the diets rich in monounsaturated fatty acids (MUFA diet), saturated fatty acids (SFA diet), and carbohydrates plus n-3 fatty acids (CHO/N3 diet). $n = 20$. One-factor ANOVA was used for the statistical analysis.

Beneficios de LA DIETA MEDITERRÁNEA, sobre los mecanismos aterogénicos. Mol Nut Food Res 2007

Level of evidence	Type of effect
Demonstrated	<ol style="list-style-type: none">1. Reduces triglycerides and increases HDL cholesterol levels when it replaces carbohydrate-rich diets2. Lowers LDL cholesterol levels when it replaces saturated fat-rich diets3. Increases resistance of LDL to oxidation4. Improves glucose metabolism in diabetes
Possible	<ol style="list-style-type: none">1. Improves the endothelium dependent vasodilatation2. Ameliorates the inflammation induced by intake of high saturated-fat diets3. Reduces the activation of mononuclear cells4. Reduces arterial blood pressure and the need for antihypertensives5. Induces a less prothrombotic plasma environment

Un paradigma: biomodulación a través de la dieta

Figure 3. Bioactive food components can influence genetic and epigenetic events associated with a host of disease processes.

E Trujillo; J Am Diet As, 2006; 106: 403

¿MÁS ALLÁ DE LA BIOLOGÍA?

Un buen ejemplo de la necesidad de ser cautos con los estudios no realizados en humanos

Monounsaturated Fatty Acids and Atherosclerosis: Opposing Views from Epidemiology and Experimental Animal Models

J. Mark Brown, PhD, Gregory S. Shelness, PhD, and Lawrence L. Rudel, PhD

Corresponding author

Lawrence L. Rudel, PhD
Department of Pathology, Section on Lipid Science,
Wake Forest University School of Medicine, Medical Center
Boulevard, Winston-Salem, NC 27157-1040, USA.
E-mail: lrudel@wfubmc.edu

Current Atherosclerosis Reports 2007, 9:494–500
Current Medicine Group LLC ISSN 1523-3804
Copyright © 2007 by Current Medicine Group LLC

lence of CHD associated with the Mediterranean diet be partially attributed to consumption of olive oil, ar rich in the monounsaturated fatty acid (MUFA) oleic and poor in saturated fatty acid (SFA). Since the seral observation by Keys [1], a number of epidemiol studies have supported the claim that olive oil and Mediterranean diet are associated with lower low-der lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels and relative ris

Metanálisis de adherencia a Dieta Mediterránea. 16 estudios con 1.574,000 personas entre 3-18 años. F Sofi. Brit Med J, 12 sep 2008

Fig 2 | Risk of all cause mortality associated with two point increase in adherence score for Mediterranean diet. Squares represent effect size; extended lines show 95% confidence intervals; diamond represents total effect size

LOS ENSAYOS CLÍNICOS: LA VIA PARA DISPONER DE UNA RESPUESTA CONSISTENTE

PREDIMED

CORDIPREV