Adherencia terapéutica en la prevención 2ª de la enfermedad Cv. ¡Una cuestión no resuelta !

Dr. Manuel Suárez Tembra
Unidad de Lípidos y RCV

DEFINICION

Se define la adherencia al tratamiento como la medida en que el *paciente asume las normas o consejos dados por el médico* o el equipo de salud, tanto desde el punto de vista de los hábitos o estilo de vida recomendados como del propio tratamiento farmacológico prescrito, expresándose como el *grado de coincidencia entre las orientaciones sugeridas por el profesional y el cumplimiento de las mismas por el paciente.*

Clasificación de la adherencia

Primaria:

- . Aquella prescripción que no se retira de la farmacia.

Secundaria:

- . Alteración de la dosis correcta.
- . Cambios en los intervalos de dosificación.
- . Olvido en la toma o aumento en la frecuencia de la dosis.
- . Suspensión del tratamiento antes del tiempo recomendado.

Problemas relevantes en cardiología 2011

Un problema alarmante en prevención secundaria: bajo cumplimiento (estilo de vida) y baja adherencia (farmacológica)

Valentín Fuster*

Adherencia terapéutica

Incumplimiento:

75% en enfermedad Psiquiátrica.

70% en asmáticos.

50% en diabéticos y dislipémicos.

33% en hipertensos (7,1% – 55,2%)

30-40% en patología aguda.

La falta de adherencia en cifras

El **24%** de los pacientes **no cumplen el tratamiento 7 días después del alta** tras un infarto de miocardio¹

El **34%** de los pacientes **interrumpe el tratamiento de al menos 1 de los fármacos y el 12% el de los 3 fármacos**, en el primer mes posterior al alta hospitalaria¹

. Un 20% de los pacientes crónicos no inicia el tratamiento prescrito.

.-Un 50% de pacientes ha abandonado el tratamiento a los 6 meses.

Mc.Horney Curr Med Res Opin 2009; 25(1):215-238

Enfermedades Crónicas y Adherencia

Figura 2. Disminución de la tasa de adherencia a la medicación en el tratamiento de distintas enfermedades crónicas a lo largo de 12 meses de seguimiento. Durante los primeros 6 meses después de la prescripción de la medicación es cuando se produce la caída más importante de la adherencia, que ya no vuelve a recuperarse. Datos publicados por la Organización Mundial de la Salud⁷ y modificados a partir de Gadkari et al⁶ y Ho et al⁸.

Datos de adherencia en España

Valencia (España) de 7053 pacientes con SCA seguidos durante 9 meses

(% pacientes que toman más de 75% de los días la medicación)

Asociación entre Adherencia Terapéutica y Mortalidad

Fig 2 Association between adherence to placebo and mortality

Fig 3 Association between adherence to harmful or beneficial drug therapy and mortality

21 estudios, 46847 pacientes

La mortalidad de los adherentes es la mitad de los no adherentes.

adherencia a la medicación en USA

Componentes de la adherencia

Razones para la no adherencia a los tratamientos

Categoría de no adherencia	Desglose de causas
Sistema sanitario	<ul style="list-style-type: none">• Baja calidad de la relación entre el paciente y el proveedor• Falta de comunicación• Falta de continuidad en los cuidados.
Enfermedad	<ul style="list-style-type: none">• Asintomática (falta de recordatorios físicos)• Enfermedades mentales (p.Ej. Depresión)
Paciente	<ul style="list-style-type: none">• Impedimentos físicos• Alteraciones cognitivas• Problemas psicológicos o de comportamiento• Jóvenes• Raza no blanca.
Tratamiento	<ul style="list-style-type: none">• Complejidad de los tratamientos• Efectos adversos
Razones socioeconómica	<ul style="list-style-type: none">• Analfabetismo; bajo nivel cultural;• Coste alto de las medicaciones• Falta de apoyo social.

Adherencia

Las cinco dimensiones de la adherencia terapéutica

- Confianza recíproca
- Continuidad asistencial
- Accesibilidad
- Satisfacción laboral

- Situación laboral
- Nivel educativo
- Condiciones de vida
- Creencias populares

- Patologías crónicas
- Ausencia de síntomas
- Tiempo de evolución
- Expectativas de curación
- Aceptación

- Complejidad
- Confianza en efectividad

- Conocimiento de la enfermedad
- Necesidad de tratamiento
- Motivación
- Estado cognitivo y afectivo

¿Cuál es el ambiente que rodea a un paciente?

Los cuales influyen positiva y/o negativamente en el paciente para el logro de sus metas

Adherencia y pacientes

Características del paciente

- Edad
- Género
- Nivel educativo y económico
- Estabilidad y soporte familiar
- Conocimiento de la enfermedad
- Actitud hacia los cuidados de salud
- Convivencia
- Estabilidad mental
- Convicciones religiosas
- Historia de adherencia
- Creencia en eficacia del tratamiento
 - Apropiación de creencias
 - Asistencia a citas
 - Expectativas

Dhanuka PK, et al.. Compliance with cardiovascular drug treatment. In: Frishman WH, Sonnenblick EH, Sica DA, eds. *Cardiovascular Pharmacotherapeutics*. McGraw Hill; 2003:27.

Adherencia y medicación

Características de la medicación

- ✓ Tipo
- ✓ Complejidad
- ✓ Empaquetado
- ✓ Cambios de estilo de vida necesarios
- ✓ Número de medicaciones
- ✓ Duración del tratamiento
- ✓ Efectos secundarios
- ✓ Costos

Dhanuka PK, et al.. Compliance with cardiovascular drug treatment. In: Frishman WH, Sonnenblick EH, Sica DA, eds. *Cardiovascular Pharmacotherapeutics*. McGraw Hill; 2003:27.

La falta de adherencia se relaciona con la polimedicación

Adherencia media con la toma de dosis

Objetivo: Revisión de 76 estudios para evaluar la asociación entre las pautas terapéuticas y la adherencia (mediante monitorización electrónica) entre 1986-2000.

Variables:

Número de dosis ingeridas en relación a las prescritas.
Tiempo de toma de la dosis en relación a lo prescrito.

Resultados:

Nº de Dosis

La adherencia fue significativamente mayor:

- En la toma de dosis única diaria
 - en comparación con 3 veces al día ($p = 0.008$)
 - en comparación a 4 veces al día ($p < 0.001$)
- En la toma de 2 dosis al día frente a 4 dosis al día ($p = 0.001$)

Frecuencia de las dosis

Una pauta de dosificación más frecuente se asoció a menor adherencia.

Los medicamentos
no funcionan si los
pacientes no se los
toman

C. Everett Koop

Relación médico-paciente

Los siete elementos principales para el éxito de la relación médico-paciente

Falta de adherencia

Cómo detectar la falta de adherencia

- **Métodos directos**
 - Observación directa de las tomas
 - Determinación del fármaco o sus metabolitos
 - Determinación de sustancias trazadoras
- **Métodos indirectos**
 - Entrevista personalizada
 - Recuento de la medicación sobrante
 - Control de la dispensación
 - Métodos electrónicos

¿Como mejorar la adherencia ?

Papel del profesional en mejorar la adherencia

Intervenciones en la adherencia

Allan Peterkin . Practical strategies for practising narrative-based medicine. Canadian Family Physician 2012; 58: 63.

1. Haga preguntas abiertas
2. No interrumpa
3. Invite a sus pacientes a escribir sobre su enfermedad
4. Facilite la expresión de preocupaciones
5. Aprenda de las historias de sus enfermos
6. Busque una metáfora o una palabra clave
7. Vea la falta de adherencia como un bloqueo narrativo
8. Registre en la historia clínica
9. Cuide su lenguaje corporal
10. Examine sus suposiciones y estereotipos
11. Pregunte ¿qué está ocurriendo? o ¿qué no hemos revisado?

Intervenciones en la adherencia

Medication Adherence: WHO Cares?

Marie T. Brown MT, Bussell JK.

Mayo Clin Proc. 2011;86 (4):304-314

1. El 50% de los pacientes no toma la medicación
2. La adherencia no es un problema exclusivo del paciente
3. La mejora en la adherencia tiene un efecto en salud mayor que el efecto de la terapia
4. El comportamiento hacia la medicación es complejo y afecta al paciente, al médico y al proceso de atención
5. La identificación de la no adherencia es un reto y requiere técnicas de entrevista específicas
6. Las soluciones incluyen un ambiente favorable, la simplificación de la pauta terapéutica, la educación del paciente, la evaluación del conocimiento en salud, y atender a la falta de adherencia no racional.
7. Hay herramientas disponibles en la Web

Intervenciones en la adherencia

La Biblioteca Cochrane Plus

2011 Número 1 ISSN 1745-9990

INTERVENCIONES PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN PACIENTES HIPERTENSOS

Liam G Glynn, Andrew W Murphy, Susan M Smith, Knut Schroeder, Tom Fahey

Esta revisión debería citarse como: Liam G Glynn, Andrew W Murphy, Susan M Smith, Knut Schroeder, Tom Fahey. Intervenciones para mejorar el control de la presión arterial en pacientes hipertensos (Revisión Cochrane traducida). En: *Biblioteca Cochrane Plus* 2010 Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com>. (Traducida de *The Cochrane Library*, 2010 Issue 3 Art no. CD005182. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

Efectos de las intervenciones: meta-análisis

Automonitorización	PAS: - 2.5 (IC: - 3.7 a - 1.3) mmHg PAD: - 1,8 (IC: - 2,4 a - 1,2) mmHg
Educación del paciente	Resultados heterogéneos
Educación del médico	Resultados heterogéneos
Atención por enfermera o farmacéutico	Resultados heterogéneos Más favorable
Intervenciones organizativas	Favorable
Recordatorio de citas	Favorable

Intervenciones en la adherencia

Revisión sistemática de 67 intervenciones para mejorar la adherencia (Biblioteca Cochrane Plus):

46% mejoraron el cumplimiento.

33% demostró mejoría significativa en los resultados clínicos.

" Mejorar la adherencia puede tener un mayor impacto en la salud de la población que cualquier otra mejora específica de los tratamientos médicos "

Haynes RB et al. *Cochrane Database Syst Rev* 2005;4:CD000011

Las enfermedades Cv como problema de salud pública

- Responsable del 25% de muertes prematuras.
- La enfermedad coronaria y la cerebrovascular responsables del 60% de la mortalidad CV total.
- Elevado número de hospitalizaciones.
- Pérdida de años potenciales de vida.

Después del cáncer, las ECV son responsables de la mayor incidencia de muertes en personas en edad productiva

Causas de falta de adherencia en prevención secundaria

De las guías a la práctica clínica

A pesar del amplio consenso sobre cuáles son los fármacos más efectivos para la prevención secundaria de la Cardiopatía Isquémica y otras enfermedades arterioscleróticas vasculares, las recomendaciones no se aplican correctamente

Enfermedad CV y Adherencia

Adherence to Drugs That Prevent Cardiovascular Disease: Meta-analysis on 376,162 Patients

Baja adherencia tanto en prevención 1^a como en 2^a Independiente del tipo de fármaco

Sayed H. Naderi, Jonathan P. Bestwick, David S. Wald
Adherence to Drugs That Prevent Cardiovascular Disease: Meta-analysis on 376,162 Patients.
American Journal of Medicine 2012; 125: 882 – 887.

La adherencia disminuye con el tiempo

Adherencia a estatinas según el tiempo

n = 143.505, mayores de 65 años

Diseño: Estudio de Cohortes retrospectivo a partir de datos obtenidos de la base Protocare Sciences Manged Care desde 1997 a 2001.

Objetivo: adherencia a antihipertensivos e hipolipemiantes tras 1 año de seguimiento

Adherencia a antiHTA según el tiempo

Pacientes no adherentes con ninguno de los 2 fármacos:

A los 3m: 27,4%

A los 6 m: 35%

A los 27 m: 39%

Elevación del N° de eventos CV en función de la adherencia

Proyecto Manhattan

(Guías de práctica clínica en USA)

Cuantificación de los no adherentes a la medicación (guías de práctica clínica de Estados Unidos)*

	Edad ≥ 55 años (n = 2.554)			Historia de ECV (n = 592)		
	Recomendación	Uso real	%	Recomendación	Uso real	%
AAS	84,2	31,6	37,5	100	44,5	44,5
Antihipertensivos	60,1	47,8	79,5	69,3	61	87,8
Estatinas	63,7	37,3	58,6	88,3	57	64,6

AAS: ácido acetilsalicílico; ECV: enfermedad cardiovascular.

*NHANES, AHA, NHLBI-JNC-7, NHLBI-NCEP.

Porcentaje de pacientes, del total de los incluidos en las guías de práctica clínica de Estados Unidos, que se adhieren al tratamiento farmacológico prescrito (AAS, antihipertensivos o estatinas) en la prevención primaria (izquierda) o secundaria (derecha) de la ECV. El valor promedio de la adherencia a la medicación no sobrepasa el 60% y, en el caso concreto del ácido acetilsalicílico, no llega al 45%. Datos modificados a partir de Muntner et al⁴.

Estudio PURE (Prospective Urban Rural Epidemiological Study)

Cuantificación de la adherencia a la medicación de los pacientes con cardiopatía isquémica/ACV en todo el mundo (n = 153.996)

Grupo farmacológico	Renta				Total
	Elevada	Media-alta	Media-baja	Baja	
Antiplaquetarios	62	24,6	21,9	8,8	25,3
Bloqueadores beta	40	25,4	10,2	9,7	17,4
IECA o ARA-II	49,8	30	11,1	5,2	19,5
Antihipertensivos	73,8	48,4	37,4	19,2	41,8
Estatinas	66,5	17,6	4,3	3,3	14,6

ACV: accidente cerebrovascular; ARA-II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina.

Todas las tendencias decrecientes desde las rentas más altas a las más bajas, $p < 0,0001$.

Porcentaje de pacientes de todo el mundo que se adhieren al tratamiento farmacológico en el contexto de la cardiopatía isquémica y ACV, clasificados según la renta media de sus países de residencia. Aunque la adherencia a la medicación está influida por el tipo de tratamiento/fármaco, existe una tendencia clara y significativa hacia una menor tasa de adherencia farmacológica a medida que disminuye la renta de los países donde residen los enfermos. Datos obtenidos del estudio PURE, Yusuf et al⁵.

Prevención secundaria tras IAM.

Repercusión clínica de la falta de adherencia

Estudio MITRA

n = 6.067

N

Medicaciones incluidas: Aspirina, beta-bloqueante, IECA y estatina

La falta de adherencia a medicaciones cardioprotectoras se asocia a una mayor tasa de eventos en pacientes (15.567) con enfermedad coronaria: Seguimiento medio 4,1 años.

IECAs —◆— Estatinas —◆— B-bloqueantes —◆—

Revascularización coronaria
n=2.117

Hospitalización CV
n=2.008

Mortalidad CV
n=372

Mortalidad total
n=1.889

Prevención secundaria tras IAM

Repercusión clínica de la falta de adherencia: Meta-análisis de 44 estudios con 1.978.919 participantes: 135.627 eventos CV y 94.260 muertes

Eventos cardiovasculares

Prevención secundaria tras IAM

Repercusión clínica de la falta de adherencia: Meta-análisis de 44 estudios con 1.978.919 participantes: 135.627 eventos CV y 94.26 muertes

Mortalidad global

38% incremento del RR de mortalidad total

El grado de control de la dislipemia es bajo

EURIKA: Objetivo combinado de c-LDL Moderado: <115 mg/dl y CT<190mg/dl; LIPICAP: riesgo bajo: <160mg/dl, moderado:<130mg/dl, alto:<100mg/dl; ENRICA: c-LDL<130mg/dl y <100mg/dl en pacientes con DM o ECV; CODIMET: <100mg/dl y <70mg/dl; EDICONDIS-ULISEA: <100mg/dl con ECV o DM y <115mg/dl alto riesgo en prev primaria; PREVALENCIA DISLIPEMIA ATEROG. EN AP: moderado: <115mg/dl, alto<100mg/dl, muy alto <70mg/dl

Un bajo porcentaje de pacientes alcanzan el objetivo de >70 mg/dl de LDL

¿ Que beneficios tiene ser adherente?

Revisión de estudios promovido por la ESC

Objetivos: determinar cómo la falta de adherencia influye en el riesgo relativo (RR) de ECV y de mortalidad por todas las causas.

- 44 estudios incluidos, 1.978.919 participantes que padecieron 135.627 eventos cardiovasculares y 94.126 muertes por cualquier **causa**.

• Buena adherencia.
(≥80% de toma de medicación)

20% disminución del riesgo de ECV.
38% disminución de mortalidad global

El 9,1% de todos los eventos son atribuibles a baja adherencia

Beneficio de las intervenciones farmacológicas

- Supervivencia al año de pacientes con IAM en función de los fármacos prescritos al alta. N= 2320

- La supervivencia al año fue menor (88.5% vs 97.7%) en aquellos pacientes post-IM que abandonan la medicación al mes. N= 1521

Curva de supervivencia de Kaplan-Meier que compara los pacientes que abandonan el uso de 1 ó más medicaciones frente a los que al alta tomaban los 3 fármacos. (log-rank test $p < 0,001$)

Al mes, un 33,7% de los pacientes había abandonado todo o parte del tratamiento

Age-related medication adherence in patients with chronic heart failure: A systematic literature review.

A total of 1565 titles were found, and ultimately, 17 studies, which provide data for a total of 162,727 patients, were analyzed

The results suggest that **older age alone is not related to poorer medication adherence compared with younger patients with CHF**. More attention should be paid to younger newly-diagnosed patients with CHF. Future studies are required to explore medication adherence in CHF in different, standardized, and specific age groups and should be sufficiently powered to assess clinical endpoints

Mortalidad al año de tratamiento

3 fármacos

RRR = - 36 % 3 vs 2

2 fármacos

RRR = - 41 % 3 vs 0-1

0-1 fármacos

Global	0-1 drug (n = 752)	P-value*	OR* (95% CI)	2 drugs (n = 2986)	3 drugs (n = 6260)	P-value†	OR† (95% CI)
Death	13.6%	<0.0001	3.04 (2.40–3.86)	9.7%	4.9%	<0.0001	2.09 (1.77–2.47)
MACCE (death/MI/stroke)	16.8%	<0.0001	2.23 (1.80–2.75)	12.7%	8.3%	<0.0001	1.60 (1.39–1.84)

*0-1 versus 3 therapy elements, †2 versus 3 therapy elements.

Adherencia y gasto sanitario

- Gastos atribuibles a episodios recurrentes de SCA > coste del primer evento. (Shetty 2008)
- El incremento del coste se debe a:
 - Número medio anual de rehospitalizaciones
 - Mayor estancia hospitalaria.
 - Alta probabilidad de una revascularización.

Los costes totales de la atención hospitalaria son más bajos en los pacientes adherentes a la prevención 2ª. (Bitton 2013)

En prevención
cardiovascular los
fármacos no hacen
que el paciente se
sienta mejor, evitan
eventos

El uso de 2 medicamentos antiHta combinados mejoran la adherencia

Ensayos clínicos con polipíldoras y su efecto sobre la adherencia

Kanyini GAP

RR=1,49

- Seguimiento medio: 18 meses
- n=623
- Primaria + Secundaria
- Pacientes que toman una u otra medicación durante los 4 días anteriores

IMPACT

RR=1,75

- Seguimiento medio: 12 meses
- n=497
- Primaria
- Nombre y dosis reportadas por paciente

UMPIRE

RR=1,33

- Seguimiento medio: 15 meses
- n=2004
- Primaria + Secundaria
- Reportado por paciente, nº días que toman medicación la semana previa

Conclusiones

- .- La falta de adherencia terapéutica es un problema de salud pública de 1ª magnitud, con una prevalencia media del 50%.**
- .- Cualquier estrategia de intervención, en orden a maximizar su eficacia debería incidir en no culpabilizar al paciente, el fortalecimiento de la confianza con el personal sanitario y la simplicidad de las intervenciones entre otras.**
- .- No se puede establecer que tipo de intervención es la mas efectiva y no se ha demostrado que ninguna intervención, aislada o en su conjunto, sea eficaz en todos los pacientes.**
- .- La combinación de diferentes estrategias es la “mejor estrategia”, y ésta debe de ser individualizada para cada paciente y su patología.**
- .- La opción de las “polipill” son de las estrategias mas eficaces.**

"Si la no adherencia a la medicación fuera una enfermedad, estaríamos ante una epidemia"

Anónimo

I WANT **YOU**
To Take Your
Medications

GRACIAS !!!