XXXV
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

Mesa redonda: ¿Qué hay de nuevo en hepatología?

HEPATITIS AUTOINMUNE

Dr. Víctor Vargas

Jefe Sección Medicina Interna – Hepatología. Hospital Vall d'Hebron

Profesor Titular Medicina. Universidad Autónoma

Barcelona

XXXV
Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Medicina Interna (SEMI)

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

Hepatitis autoinmune

- Enf. crónica hepática de etiología incierta
- Infiltrado linfocítico o linfoplasmocítico con hepatitis en interfase
- Necrosis panacinar o panlobulillar
- Elevación predominante transaminasas
- Con autoanticuerpos e hipergammaglobulinemia
- Exclusión de otras enfermedades crónicas.

Hepatitis autoinmune. histología

Hepatitis autoinmune. histología

XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

Hepatitis autoinmune ¿qué hay de nuevo?

- Patogenia
- Clasificación por Autoac
- Diagnóstico
- Nuevas formas clínicas:
 - Aguda
 - Inducidas
 - Formas “overlap”
- Tratamientos: nueva pautas, trasplante
- Formas post trasplante

XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

Hepatitis autoinmune ¿qué hay de nuevo?

- Patogenia
- Clasificación por Autoac
- Diagnóstico
- Nuevas formas clínicas:
 - Aguda
 - Inducidas
 - Formas “overlap”
- Tratamientos: nueva pautas, trasplante
- Formas post trasplante

Patogénesis de la hepatitis autoinmune

Activation of T cells

Molecular mimicry between autoantigens and pathogens, drugs, etc.

GWAS (genome-wide association study) en 641 hepatitis autoinmune

Gen	OR (95% IC)	Función
HLA-DRB1*0301	2,9 (2,6-3,4)	Presentacion antígeno
HLA-DRB1*0401	2,3	Presentación antígeno
SH283	1,4 (1,2-1,6)	Inhibe activación célula T Hematopoyesis, citoquina
CARD10	1,7 (1,4-2,1)	Proinflamatoria en hígado
Otros SNP		Asociados con enfermedades inmunes.

De Boer, Gastroenterology 2014

Patogénesis de la hepatitis autoinmune

Activation of T cells

- costimulatory receptors
- Cytokines

Regulatory mechanisms

Inhibitory receptors

Patogénesis de la hepatitis autoinmune

XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

Hepatitis autoinmune ¿qué hay de nuevo?

- Patogenia
- Clasificación por Autoac
- Diagnóstico
- Nuevas formas clínicas:
 - Aguda
 - Inducidas
 - Formas “overlap”
- Tratamientos: nueva pautas, trasplante
- Formas post trasplante

Clasificación de la hepatitis autoinmune basada en anticuerpos

Tipo	Anticuerpos	Clínica
Hepatitis autoinmune tipo 1	ANA, SMA	80% casos Edad: 16-30 años Inicio lento
Hepatitis autoinmune tipo 2	LKM	20% casos Niños También casos fulminantes
Hepatitis autoinmune tipo 3 (?)	SLA/LP	Similar al tipo 1

Autoanticuerpos en el diagnóstico de la hepatitis autoinmune

Antibody	Target Antigen(s)	Liver Disease	Value in AIH
ANA*	Multiple Targets including: •Chromatin, •Ribonucleoprotein •Ribonucleoprotein complexes	AIH PBC PSC Drug-induced Chronic Hepatitis C Chronic Hepatitis B NASH	Diagnosis of type 1 AIH
SMA*	Microfilamentes Intermediate filaments (vimentin, desmin)	Same as ANA	Diagnosis of type 1 AIH
LKM-1*	Cytochrom P450 2D6 (CYP2D6)	Type 2 AIH Chronic Hepatitis C	Diagnosis of type 2 AIH
LC-1*	Formiminotransferase cyclo-deaminase (FTCD)	Type 2 AIH Chronic Hepatitis C	Diagnosis of type 2 AIH Prognostic implications Severe disease
pANCA (atypical)	Nuclear Lamina proteins	AIH PSC	Diagnosis of type 1 AIH Re-classification of cryptogenic chronic hepatitis
SLA	tRNP ^{SER} Sec	AIH Chronic hepatitis C	Diagnosis of AIH Prognostic implications Severe Disease Relapse Treatment dependence
LKM3	UDP-Glucuronosyl- transferases Typ 1	Chronic Hepatitis D Type 2 AIH	Diagnosis of type 2 AIH

XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

Hepatitis autoinmune ¿qué hay de nuevo?

- Patogenia
- Clasificación por Autoac
- **Diagnóstico**
- Nuevas formas clínicas:
 - Aguda
 - Inducidas
 - Formas “overlap”
- Tratamientos: nueva pautas, trasplante
- Formas post trasplante

Crterios diagnsticos HAI (International AH Group, J Hepatol 1999)
sin trat: >15 definitivo; 10-15 probable
sn trat: >17 definitivo; 12-17 probable

Variable	Puntos a favor	Puntos en contra
Sexo	Mujer (+2)	
Alcohol	<25 g (+2)	>60 g (-2)
Farmacos hepatotox.	No (+1)	Presente (-2)
Otra enf. autoi.	Presente (+2)	
El. F.alc / el. ALT	<1,5 (+2)	>3 (-2)
Globulina, gamma, IgG	>x2 vn (+3); 1,5-2 (+2); 1-1,5 (+1)	
ANA o SMA o LKM	≥ 1:80 (+3); 1:80 (+2); 1:40 (+1)	
AMA	Negativo (+3)	Positivo (-3)
Marcadores hepatitis	Negativo (+3)	Positivo (-3)
Otros autoanticuerpos	Presentes (+2)	
HLA-DR3 o HLA-DR4	Presente (+1)	
Histología	Hepatitis interfase (+3) Inf. Linfoplasmocitico (+1) Rosetas (+1)	Ninguno (-5) Cambios biliares (-3) Otros (-3)
Respuesta terapia	Remisi3n completa (+2) Remisi3n con recaida (+3)	

Criterios diagnósticos simplificados HAI

Variable	Cutoff	Puntos
ANA o SMA	$\geq 1:40$	1
ANA o SMA ó LKM ó SLA	$\geq 1:80$ $\geq 1:40$ positivo	2
IgG	Anormal	1
	$>1,1$ vn	2
Histología hepática	Compatible	1
	Típica	2
Ausencia hepatitis viral	Si	2
	≥ 6 probable ≥ 7 definitiva	

Los criterios simplificados tiene alta especificidad , pero son algo menos sensibles

XXXV
**Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Medicina Interna (SEMI)**

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

Hepatitis autoinmune ¿qué hay de nuevo?

- Patogenia
- Clasificación por Autoac
- Diagnóstico
- Nuevas formas clínicas:
 - Aguda
 - Inducidas
 - Formas “overlap”
- Tratamientos: nueva pautas, trasplante
- Formas post trasplante

Hepatitis autoinmune tipo 1

Hallazgos clínicos “clásicos”

Hepatitis autoinmune Predominio mujeres, NO JÓVENES

Gronbaek, J Hepatol 2014

XXXV
Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Medicina Interna (SEMI)

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

Hepatitis autoinmune. Estudio retrospectivo HVH (1980-2007). n=69

García Martínez R et al. AEEH, 2008

Hepatitis autoinmune.

Presentación aguda – aguda grave

Clinica como hepatitis aguda:

- Enfermedad nueva
- Enfermedad crónica con exacerbación
- HAI con lesión + otra etiología sobreañadida

Hepatitis aguda grave: con encefalopatía.

Hepatitis autoinmune.

Datos laboratorio (xVNM): aguda vs crónica

	IgG normal	ANA<1/80
Aguda	25-39%	29-39%
Crónica	20%	20%

*Takahashi H, Hepatol res 2011
Yasui S, J Gastroenterol 2011
Fujiwara, J Gastroenterol 2008*

Diagnóstico diferencial: Hepatitis aguda.

Hepatitis autoinmune aguda. ¿Datos histológicos característicos?

Necrosis zona 3 centrolobulillar

Hepatitis E

Histología puede ser similar a HAI

Hepatitis autoinmune

Alta prevalencia de anti-VHE

Pischke S et al. PlosOne 2014

Hepatitis autoinmune.

“Aftermath” ó secuela de una exposición

Infección Viral:

- Hepatitis E, hepatitis C
- Exposición a fármacos e inmunomoduladores
- Trasplante hepático.

Hepatitis autoinmune en hepatitis crónica C.

VHC/HAI: histología por patólogo experto.

Predictores independientes VHC/HAI:

- ANA, mujer,
- Niveles elevados RNA-VHC, ALT y gammaglobulina
- Gran inflamación periportal

HEPATITIS CRÓNICA VHC (N=787)

VHC/HAI = 15 (2%) /2IFN.

Hepatitis autoinmune inducida por fármacos

“Drug Induced Liver Injury –DILI- with Autoimmune features”

Hepatitis autoinmune (N=261)

Características:

- > 3 meses post exposición
- Formas crónicas más fr.
- Clínica, bioquímica y serología igual HAI
- Histología similar:
 - Más neutrófilos portales
 - Más colostasis intracelular
- Buena respuesta cortis
- No recidivas.*

Bjornsson et al, Hepatology 2010

deLemos et al, Semin Liv Dis 2014

Hepatitis autoinmune inducida por fármacos

“Drug Induced Liver Injury –DILI- with Autoimmune features”

Fármacos más implicados:

- Hidralacina, metil dopa, minociclina, nitrofurantoina, procainamida
- Diclofenaco
- Estatinas:
 - DILIN: 22 casos DILI por estatina: 6 (27%) Autoinmune
- Interferón
- Anti-TNF

Síndromes “overlap”

Overlap CBP-HAI

- Histología HAI con AMA
- Histología CBP, AMA (-):
 - Colangiopatía autoinmune?
 - CBP AMA negativo
- Histología CBP, AMA+, inflamación lobul. ALT y IgG

Overlap CEP-HAI

- Clínica, serología HAI + alteraciones biliares

Actitud ante pacientes con CBP y CEP con datos de HAI

XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

Hepatitis autoinmune ¿qué hay de nuevo?

- Patogenia
- Clasificación por Autoac
- Diagnóstico
- Nuevas formas clínicas:
 - Aguda
 - Inducidas
 - Formas “overlap”
- Tratamientos: nueva pautas, trasplante
- Formas post trasplante

La terapia con corticoides mejora la supervivencia en la hepatitis autoinmune

Tratamiento de la hepatitis autoinmune

Manns, Guías clínicas AASLD, Hepatology 2010

	Monoterapia	Terapia combinación		
	Prednisona (mg)	Prednisona (mg)	Azatioprina	
			USA (mg/d)	Europa (mg/kg/día)
Semana 1	60	30	50	1-2
Semana 2	40	20	50	1-2
Semana 3	30	15	50	1-2
Semana 4	30	15	50	1-2
Mantenimiento	20 ó menos	10	50	1-2
Razones elección terapia	Citopenia Def. Tiopurinmt Embarazo Tumores Terapia < 6m	Postmenopausica Osteoporosis Diabetes, hipertensión no controlada Obesidad Acné Labilidad emocional Menos efectos adversos		

La budesonida es más eficaz que prednisona en la inducción de la remisión en la hepatitis autoinmune

	Segmento A									Segmento B
	Mes 1				Mes 2				Meses 3-6	Meses 7-12
	S.1	s.2	s.3	s.4	s.5	s.6	s.7	s.8		
Grupo budesonida										
Budesonida	3mg TID	← 3mgTID, tras remisión bioquímica: 3 mg BID →								
Azatioprina	← 1-2 mg Kg día →									
Grupo prednisona										
		Dosis alta prednisona							Budesonida 3 mg TID, tras remisión bioquímica: 3 mg BID	
Prednisona	40mg/ día	40mg/ día	40 mg/ día	30mg/ día	25mg/ día	20mg/ día	15mg/ día	10mg/ día		
		Dosis baja prednison								
		30mg/ día	25 mg/ día	20mg/ día	15mg/ día	10mg/ día	10mg/ día	10mg/ día		
Azatioprina	← 1-2 mg Kg día →									

Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado y multicéntrico

Manns MP et al. Gastroenterology 2010; 139: 1198-1206

La budenosida es más eficaz que prednisona en la inducción de la remisión en la hepatitis autoinmune

Pero: contraindicada en cirróticos, eficacia a largo término desconocida

Manns MP et al. Gastroenterology 2010.

Hepatitis autoinmune .

Recaida tras abandono de tratamiento

Van Gerven et al. J. Hepatol 2013

Hepatitis autoinmune .

La histología al fin del tratamiento predice el riesgo de recaída

Czaja, AJ, Davis, GL, Ludwig, J, Taswell, HF. Hepatology 1984, 4:622
Czaja, AJ, Carpenter, HA. Liver International 2003, 23:116

Hepatitis autoinmune - Nuevos fármacos

Fármaco no habitual	Indicaciones	Resultados
Mofetil micofenolato	<i>Intolerancia azatioprina</i> HAI refractaria <i>Terapia primera línea</i>	58% RC 12% RC 88% RC
Ciclosporina	HAI refractaria ó recidivante	93% mejoría
Tacrolimus	HAI refractaria ó recidivante	98% mejoría
Rituximab	HAI refractaria ó recidivante	Mejoría bioquímica
Infliximab	HAI refractaria ó recidivante	Mejoría bioquímica
Ciclofosfamida	HAI refractaria ó recidivante	91% RC
Metotrexate	HAI refractaria	Mejoría bioquímica
Ac. ursodesoxicólico	Adición a otras terapias	Mejoría bioquímica

Micofenolato en hepatitis autoinmune

Terapia de primera línea: Prednisolona + MMF

59 pacientes: 52/59 respuesta inicial

37% retirada de esteroides

Zachou, J Hepatol 2011

Terapia de segunda línea

36 pacientes: intolerantes azatioprina/fallo

remisión total: 39%

Hennes, Am J Gastroenterol 2008

Hepatitis autoinmune - Nuevos fármacos

Fármaco no habitual	Indicaciones	Resultados
Mofetil micofenolato	<i>Intolerancia azatioprina</i> HAI refractaria <i>Terapia primera línea</i>	58% RC 12% RC 88% RC
Ciclosporina	HAI refractaria ó recidivante	93% mejoría
Tacrolimus	HAI refractaria ó recidivante	98% mejoría
Rituximab	HAI refractaria ó recidivante	Mejoría bioquímica
Infliximab	HAI refractaria ó recidivante	Mejoría bioquímica
Ciclofosfamida	HAI refractaria ó recidivante	91% RC
Metotrexate	HAI refractaria	Mejoría bioquímica
Ac. ursodesoxicólico	Adición a otras terapias	Mejoría bioquímica

Infliximab en la hepatitis autoinmune

Trasplante hepático en HAI.

- Indicaciones:
 - Fallo hepático agudo
 - Cirrosis descompensada y MELD>15
 - Desarrollo hepatocarcinoma (crit. Milán)
- Resultados: ELTR.

Periodo	Pacientes	%	Sup. 1 a. Paciente	Sup. 5 a. Paciente	Sup.10 a. Paciente
1988-2001	991	3	81	72	65
2000-2009	1069	2	88	80

XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

Hepatitis autoinmune ¿qué hay de nuevo?

- Patogenia
- Clasificación por Autoac
- Diagnóstico
- Nuevas formas clínicas:
 - Aguda
 - Inducidas
 - Formas “overlap”
- Tratamientos: nueva pautas, trasplante
- Formas post trasplante

XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

IV Congreso Ibérico de Medicina Interna
II Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia

19-21 Noviembre 2014
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Murcia

HAI después trasplante hepático

- ***Recidiva enfermedad: 23%;***
 - Mediana tiempo post Tx: 26 meses
 - Inhibición cel T reg (?) por inmunosupresión.

HAI después trasplante hepático

- *Recidiva enfermedad: 23%;*
 - Mediana tiempo post Tx: 26 meses
 - Inhibición cel T reg (?) por inmunosupresión.
- **Hepatitis autoinmune de novo:**
 - 1 año después trasplante
 - Responde bien : aumento inmunosupresión
 - Respuesta inmune frente a aloantígenos en el hepatocito (*forma especial de rechazo*)
 - Ej: glutatión transferasa (GST1) : en receptores sin el gen que codifica para GST1
 - No sería el único aloantígeno
 - También descrita en trasplantados por VHC después de trat. Peg+riba