



DOXY-PEP RECOMENDACIONES GENERALES PARA SU USO



¿A QUIÉN INDICAR?



- ✓ Pacientes de alto riesgo de ITS
- ✓ HSH / mujeres trans con ITS previas
- ✓ Alta actividad sexual / múltiples parejas



¿CÓMO PRESCRIBIR?



- ✓ 200 mg doxiciclina postexposición
- ✓ Ideal ≤ 24 h (máx. 72 h)
- ✓ Siempre con supervisión médica



ventanal de oportunidad



ENFOQUE INTEGRAL



- ✓ Integrar con: PrEP VIH
- Vacunación (VPH, hepatitis, mpox)
- Educación sexual



CLAVES CLÍNICAS



- ✓ Principal beneficio: prevención de sífilis
- ✓ Efectivo también en clamidia
- ✓ Limitado en gonorrea (alta resistencia en UE)

resistance




SEGUIMIENTO



- ✓ Cribado ITS cada 3-6 meses
- ✓ Test VIH en seronegativos
- ✓ Reevaluar riesgo periódicamente



RIESGOS



- ✓ Selección de resistencia antimicrobiana
- ✓ Uso racional imprescindible
- ✓ Evitar automedicación



MENSAJE FINAL

➡ Estrategia eficaz si se usa de forma dirigida, monitorizada y dentro de programas de salud