

EL ATLAS DEL ICTUS



COMUNIDAD VALENCIANA

2019

CON EL AVAL
CIENTÍFICO DE:



FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ASOCIACIONES
DE ANTICOAGULADOS

CON EL AVAL DE:

weber



Bristol-Myers Squibb





[ÍNDICE]

Introducción	7
Objetivos	9
Metodología	11
Resultados	19
1 Epidemiología y perfil sociodemográfico de los pacientes con ictus	19
2 Consumo de recursos sanitarios	22
2.1 Destino al alta hospitalaria	22
2.2 Utilización de recursos sanitarios	22
2.3 Utilización de servicios de ayuda domiciliaria	24
3 Carga social del ictus	25
3.1 Estado de salud y calidad de vida	25
3.2 Dependencia	29
3.2.1 Personas de 65 años o más	29
3.2.2 Personas con discapacidad	31
4 Carga económica asociada al ictus	33
4.1 Coste asociado a los casos incidentes de ictus	33
4.2 Coste asociado a los cuidados en la fase aguda del ictus	33
4.3 Coste asociado a los cuidados informales	33
5 Situación actual de la anticoagulación	35
Puntos clave	39
Referencias	41
Índice de tablas	45
Índice de figuras	46



[ABREVIATURAS]

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
ACODs	Anticoagulantes Orales Directos
AVAC	Años de Vida Ajustados por Calidad
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª edición
DE	Desviación estándar
EDAD08	Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008
ENSE	Encuesta Nacional de Salud de España
FA	Fibrilación auricular
FANV	Fibrilación Auricular No Valvular
HTA	Hipertensión Arterial
INE	Instituto Nacional de Estadística
M€	Millones de euros
MSSSI	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
CMBD-H	Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalización



INTRODUCCIÓN

El ictus es una enfermedad cerebrovascular que tiene un gran impacto sanitario y social debido a una elevada incidencia y prevalencia, y a que constituye la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia después de la enfermedad de Alzheimer¹. Supone una gran carga, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también personal y familiar, por su impacto en la vida de las personas que lo sufren y en la de sus cuidadores².

Algunos factores demográficos como la edad, el sexo o el lugar de residencia influyen en la prevalencia y en la incidencia de ictus². En España, la prevalencia estimada de ictus en el año 2006 fue del 6,4% en población de 70 años o más, con diferencias significativas en función del sexo (7,3% en hombres y 5,6% en mujeres) y del territorio (8,7% en zonas urbanas y 3,8% en rurales)³. Además, tanto la incidencia como la prevalencia se incrementa en edades avanzadas, particularmente entre las mujeres³⁻⁵. Datos del estudio IBERICTUS demuestran una incidencia de ictus en nuestro medio de 187,4 casos por cada 100.000 habitantes⁵. Se prevé que dicha incidencia se incremente un 35% entre 2015 y 2035 debido, en gran parte, al aumento de la esperanza de vida de la población⁶.

Actualmente, en España cada año mueren en torno a 27 mil personas a causa de un ictus⁷. Se prevé que el número de defunciones relacionadas con el ictus se incremente un 39% entre 2015 y 2035⁶, debido principalmente al incremento de la incidencia mencionado anteriormente y a que está ligado con el progresivo envejecimiento de la población².

Por otro lado, los pacientes que sobreviven a un ictus suelen sufrir secuelas físicas relacionadas con la movilidad, la visión o el habla, así como trastornos del ánimo, cognitivos y de personalidad⁸. Esto impacta en su funcionalidad y en la calidad de vida. Se estima que dos de cada tres personas que sobreviven a un ictus presentan algún tipo de secuela, en muchos casos discapacitantes⁹, lo que implica una pérdida de productividad en el caso de pacientes en edad laboral, una necesidad de rehabilitación y de cuidados, y un mayor consumo de recursos respecto al resto de la población.

Frente a estas cifras impactantes, es importante recordar que más del 80% de los ictus son evitables¹⁰ y que la incidencia se puede reducir de manera eficaz con un adecuado control de los factores de riesgo modificables². Una adecuada prevención tiene un gran peso en la reducción del impacto de la enfermedad. Los factores de

riesgo modificables más importantes relacionados con el ictus son la hipertensión arterial (HTA), el consumo de tabaco o alcohol, la diabetes mellitus, la dieta, la inactividad física, la obesidad, la hipercolesterolemia, la fibrilación auricular (FA) y otras enfermedades cardíacas¹¹. Entre ellos, probablemente el factor de mayor peso es la HTA y está claramente demostrado que el manejo adecuado de la HTA reduce significativamente el riesgo de ictus¹². Por su parte, la FA multiplica por cinco el riesgo de padecer un ictus, siendo la causa subyacente en aproximadamente el 20% de los ictus isquémicos. Los ictus causados por FA son, además, más graves y se asocian a mayor mortalidad¹³. De forma similar a lo que ocurre con el manejo adecuado de los niveles tensionales, la anticoagulación reduce significativamente la incidencia de ictus por FA^{14,15}. En España, aproximadamente el 50% de los pacientes con FA que toma antivitamina K no están bien controlados, lo que puede derivar en un ictus o en una hemorragia¹⁶.

El avance realizado en el tratamiento en la fase aguda del ictus, fundamentalmente la organización de la asistencia urgente, el manejo de los pacientes en Unidades de Ictus y las terapias de reperusión (trombólisis intravenosa y trombectomía mecánica) en el ictus isquémico agudo, han permitido mejorar el pronóstico funcional de los pacientes. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos actuales y la previsión para los próximos años, es imperativo mejorar la prevención, así como la rehabilitación de las secuelas. La adecuada asignación de recursos y la mejora en la planificación e implementación de programas de prevención, así como el manejo de los pacientes una vez pasada la fase aguda exigen el conocimiento adecuado de la magnitud real del impacto del ictus en nuestro medio, lo que probablemente redundará en una mejor salud y calidad de vida de la población.

Este informe pretende contribuir a ese mejor conocimiento del impacto del ictus en la Comunidad Valenciana.

OBJETIVOS

Los objetivos perseguidos con este informe son los siguientes:

- 1) Describir la epidemiología del ictus en la Comunidad Valenciana, en términos de incidencia, prevalencia y mortalidad, y el perfil sociodemográfico de los pacientes con ictus.
- 2) Describir el consumo de recursos sanitarios asociados al ictus en la Comunidad Valenciana.
- 3) Describir la carga social asociada al ictus en función del estado de salud, la calidad de vida y la dependencia que genera.
- 4) Evaluar la carga económica asociada al ictus en la Comunidad Valenciana, tanto en relación con los casos incidentes, como en relación con los costes generados durante la fase aguda y los cuidados informales.
- 5) Considerando que la FA es uno de los principales factores de riesgo de ictus y que su impacto se puede modificar significativamente con la administración de tratamiento anticoagulante, se pretende analizar la situación actual de la anticoagulación por fibrilación auricular no valvular (FANV) en la Comunidad Valenciana y el potencial impacto del seguimiento de las recomendaciones de práctica clínica para el manejo de la FANV.



METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior se han combinado diferentes metodologías:

- Para la obtención de datos en relación con los tres primeros objetivos, se han utilizado fuentes primarias de datos de encuestas y registros oficiales.
- Para la obtención de datos en relación con el cuarto objetivo, se ha realizado una revisión de literatura científica.
- Para lograr el último objetivo, se ha realizado un estudio de costes a partir de datos previamente publicados en la literatura.

OBJETIVO 1.

Descripción de la epidemiología del ictus

1. La **incidencia** se ha calculado a partir de la aplicación de la tasa reportada en el estudio IBERICTUS (187,4 casos por 100.000 habitantes)⁵ a la población de la Comunidad Valenciana de 18 años o más a 1 de enero de 2018¹⁷.
2. La **prevalencia** se ha calculado a partir de la consulta de los microdatos de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) 2017 (Anexo I), donde los entrevistados declararon haber sido diagnosticados de “*Ictus (embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral)*” por un médico alguna vez en su vida¹⁸.
3. La **mortalidad** por ictus y la **posición que ocupa entre las causas más frecuentes de mortalidad** se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística¹⁹. La **tasa de mortalidad ajustada por edad** se ha obtenido a partir de datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social⁷. En ambos casos se ha utilizado 2016 como año de referencia y el epígrafe del grupo de causas de muerte 059 *Enfermedades*

cerebrovasculares, que se corresponde con los códigos I60-I69 de la lista detallada de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª edición (CIE-10) (Anexo II).

Descripción del perfil sociodemográfico de los pacientes con ictus

Para este objetivo se han analizado los datos del Cuestionario de Adultos de la ENSE 2017 (Anexo I). Esta encuesta se elaboró de manera periódica por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), siendo el año 2017 el último disponible. Su objetivo principal es la obtención de información relacionada con la salud de la población residente en España.

Se han analizado los microdatos del Cuestionario de Adultos, que consta de 23.089 entrevistas personales, distribuidas a lo largo de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, de manera proporcional al tamaño de estas, y recogidas entre octubre de 2016 y octubre de 2017. El número de casos válidos reportado se ha obtenido mediante la aplicación del factor de elevación poblacional de la encuesta.

La información extraída corresponde al apartado *E.- Características demográficas*, que incluye el sexo, la edad y el nivel de estudios.

Para analizar el perfil sociodemográfico de los pacientes con ictus, se han comparado estos con sujetos diagnosticados de otras enfermedades crónicas recogidas en la ENSE 2017 así como con pacientes sanos (TABLA 1).

TABLA 1. GRUPOS DE ENFERMEDADES COMPARADOS EN LA ENSE 2017.

GRUPOS DE PERSONAS	DEFINICIÓN
Ictus	<p>Pacientes que han padecido un ictus en algún momento de su vida.</p> <p>*Este grupo puede presentar otra serie de comorbilidades (incluidas las de los otros grupos), aparte del ictus.</p>
Otras enfermedades crónicas	<p>Se incluyen pacientes que presentan alguna de las siguientes enfermedades: tensión alta, infarto de miocardio, angina de pecho (enfermedad coronaria), otras enfermedades del corazón, varices en las piernas, artrosis (excluyendo artritis), dolor de espalda crónico (cervical), dolor de espalda crónico (lumbar), alergia crónica como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica alimentaria o de otro tipo (asma alérgica excluida), asma (incluida asma alérgica), bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, úlcera de estómago o duodeno, incontinencia urinaria o problemas de control de orina, colesterol alto, cataratas, problemas crónicos de piel, estreñimiento crónico, cirrosis, disfunción hepática, depresión, ansiedad crónica, otros problemas mentales, migraña o dolor de cabeza frecuente, hemorroides, tumores malignos, osteoporosis, problemas de tiroides, problemas de riñón, problemas de próstata, problemas del periodo menopáusico, lesiones o defectos permanentes causados por un accidente.</p> <p>*Ningún paciente incluido en este grupo presenta ictus.</p>

GRUPOS DE PERSONAS	DEFINICIÓN
Pacientes sanos	Personas que no han sido diagnosticadas de ictus ni de ninguna otra enfermedad crónica de las especificadas en el listado del Cuestionario de Adultos de la ENSE.

OBJETIVO 2.

Descripción del consumo de recursos sanitarios asociados al ictus

Para este objetivo se han analizado los datos de:

- El Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalización (CMBD-H)** de 2015, del Sistema Nacional de Salud y correspondientes al epígrafe *0908 Enfermedades cerebrovasculares* del listado reducido internacional de morbilidad hospitalaria (ISHMT), que equivale a los códigos I60-I69 de la lista detallada CIE-10 (Anexo II). La información extraída incluye el número y el tipo de altas hospitalarias por ictus. Asimismo, se han consultado datos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública referentes al año 2017²⁰.
- La ENSE 2017. Los datos seleccionados para analizar este objetivo se recogen en la TABLA 2.

TABLA 2. INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE LA ENSE 2017.

APARTADOS	INFORMACIÓN ANALIZADA
N.- Consultas médicas y otros servicios ambulatorios	<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes que han consultado al médico general o de familia en las últimas 4 semanas. • Pacientes que han consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas. • Pacientes que han acudido a fisioterapia, psicología y enfermería en los últimos 12 meses. • Pacientes que han usado los servicios asistenciales de ayuda domiciliaria en los últimos 12 meses.
O.- Hospitalizaciones, urgencias y seguro sanitario	<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes que han sido hospitalizados en los últimos 12 meses. • Pacientes que han acudido a urgencias en los últimos 12 meses.

Nota: información obtenida de los apartados indicados y de las preguntas 48, 50, 58, 61, 66 y 78 de la ENSE 2017 (Anexo I)

Al igual que se ha hecho con el perfil sociodemográfico, para evaluar el consumo de recursos asociados al ictus, se han comparado estos con sujetos diagnosticados de otras enfermedades crónicas y con sujetos sanos (TABLA 1).

OBJETIVO 3.

Descripción de la carga social asociada al ictus en función del estado de salud, la calidad de vida y la dependencia que genera

Los datos de este bloque se han desglosado en dos apartados: 1) Análisis del estado de salud y la calidad de vida, y 2) Análisis de la dependencia originada.

Para ello se han utilizado distintas fuentes:

- a) Los datos recogidos en los apartados de la ENSE 2017 que se muestran en la TABLA 3.

TABLA 3. APARTADOS DE LA ENSE 2017 A PARTIR DE LOS QUE SE HA EVALUADO EL ESTADO DE SALUD Y LAS LIMITACIONES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN PACIENTES CON ICTUS.

APARTADOS	INFORMACIÓN ANALIZADA
G.- Estado de salud	<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes según su estado de salud autopercebido. • Pacientes con enfermedades o problemas de salud.
M.- Salud mental y estrés laboral	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de riesgo de mala salud mental GHQ-12^a
L.- Limitaciones para la realización de las actividades de la vida cotidiana (solo para personas con 65 años o más)	<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes con dificultades en actividades de la vida cotidiana. • Pacientes que disponen de ayuda para actividades de la vida cotidiana. • Pacientes que necesitan más ayuda de la que disponen. • Pacientes con dificultades en actividades relacionadas con el hogar.

^a Su puntuación oscila entre 0 y 12 puntos, mejor y peor estado de salud mental, respectivamente²¹.

Nota: información obtenida de los apartados indicados y de las preguntas 21, 25, 39, 40, 41, 42 y 47 de la ENSE 2017 (Anexo I)

Al igual que se ha hecho anteriormente, se han comparado estos con sujetos diagnosticados de otras enfermedades crónicas y con la población sana (TABLA 1).

- b) La ENSE 2011-12, penúltima versión de la serie ENSE, dado que incluye datos de calidad de vida que no recoge la ENSE 2017. Se han analizado los microdatos del Cuestionario de Adultos, que consta de 21.007 entrevistas personales, recogidas entre junio de 2011 y junio de 2012. El número de casos válidos reportado se ha obtenido mediante la aplicación del factor de elevación poblacional de la encuesta.

La información extraída pertenece al apartado *I.- Calidad de vida relacionada con la salud* (Ver Anexo III), donde se incluye el cuestionario validado EQ-5D-5L del Grupo EuroQol²². Esta escala evalúa el nivel de problemas en relación con cinco dimensiones (movilidad, autocuidado, actividades cotidianas, dolor o malestar, ansiedad o depresión), y permite calcular los años de vida ajustados por calidad (AVAC) anuales, que oscilan entre 0 (peor estado de salud imaginable) y 1 (mejor estado de salud imaginable).

Para evaluar la calidad de vida de los pacientes con ictus, se han realizado las mismas comparaciones con otros trastornos que las realizadas para la ENSE 2017 (TABLA 1), con la excepción del epígrafe “angina de pecho” (dentro del grupo de Otras enfermedades crónicas), cuya información no se recogió en esta versión.

c) La **Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008 (EDAD08)** (Anexo IV). Esta es la última versión disponible de esta encuesta de ámbito nacional realizada por el INE en colaboración con el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales y la fundación ONCE. Su objetivo principal fue obtener información sobre las personas dependientes residentes en España en viviendas familiares. Ofrece información sobre personas con discapacidad, definida como la limitación importante para realizar actividades de la vida diaria con una duración o predicción de duración de más de un año, de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.

Dentro de esta Encuesta, se han analizado los microdatos del Cuestionario de Discapacidad. Este cuestionario consta de 22.795 entrevistas personales, estratificadas por provincia de forma proporcional a su tamaño, y recogidas entre octubre de 2007 y febrero de 2008. El número de casos válidos reportado se ha obtenido mediante la aplicación del factor de elevación poblacional de la encuesta.

La información se ha extraído de los apartados de la encuesta recogidos en la TABLA 4.

TABLA 4. INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE LA EDAD08.

APARTADOS	INFORMACIÓN ANALIZADA
D. Información relativa a prestaciones sanitarias, sociales y económicas	<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes que han recibido una prestación monetaria periódica. • Tipo de prestación monetaria periódica recibida. • Pacientes que han recibido una prestación monetaria no periódica. • Tipo de prestación monetaria no periódica recibida.
K. Información relativa a la salud	<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes según su estado de salud autopercebido.

Nota: información obtenida de los Apartados D (preguntas 4, 5 y 7) y K (pregunta 1) de la EDAD08 según figura en el anexo IV

Para la obtención de los datos presentados en este estudio se han comparado los sujetos con ictus con pacientes que presentan otras enfermedades crónicas con base en los datos disponibles en la EDAD08 (TABLA 5).

TABLA 5. GRUPOS DE ENFERMEDADES COMPARADOS EN LA EDAD08.

GRUPOS DE PERSONAS	DEFINICIÓN
Ictus	<p>Pacientes que han padecido un ictus en algún momento de su vida.</p> <p>*Este grupo puede presentar otra serie de comorbilidades (incluidas las del otro grupo), aparte del ictus.</p>

GRUPOS DE PERSONAS	DEFINICIÓN
Otras enfermedades crónicas	<p>Pacientes que presentan alguna de las siguientes enfermedades: Lesión Medular; Parkinson; Esclerosis lateral; Esclerosis múltiple; Agenesia / Amputaciones; Laringectomías; Artritis / Artrosis; Artritis reumatoide. Espondilitis anquilopoyética; Distrofia muscular; Espina bífida/hidrocefalia; Infarto de miocardio. Cardiopatía isquémica; Síndrome de Down; Autismo y otros trastornos asociados al autismo; Parálisis cerebral; Daño cerebral adquirido; Demencia de tipo Alzheimer; Otras demencias; Esquizofrenia; Depresión; Trastorno Bipolar; Retinosis pigmentaria; Miopía magna; Degeneración macular senil; Retinopatía diabética; Glaucoma; Cataratas; VIH/sida; Enfermedades raras; Insuficiencia renal.</p> <p>*Ningún paciente incluido en este grupo presenta ictus.</p>

Para el análisis de la dependencia se utilizan además los datos correspondientes a limitaciones para la realización de actividades de la vida cotidiana en personas de 65 años o más, recogidas en el apartado L de la ENSE 2017 (TABLA 3).

OBJETIVO 4.

Evaluar la carga económica asociada al ictus en la Comunidad Valenciana.

1) Estimación del coste total anual de los casos incidentes de ictus.

Dicha estimación se ha realizado aplicando la tasa de incidencia reportada anteriormente (187,4 casos por 100.000 habitantes)⁵ a la población de 18 años o más a 1 de enero de 2018¹⁷. Los casos incidentes se han multiplicado por el coste aproximado por paciente y año reportado en la literatura, que equivale a 27.711 €²³. Este coste incluye costes directos sanitarios, costes directos no sanitarios (cuidados informales, formales y otros costes) y costes indirectos (pérdidas de productividad laboral).

2) Estimación del coste total de los cuidados de pacientes con ictus en la fase aguda.

Dicha estimación se ha realizado multiplicando el número total de altas hospitalarias por el coste medio por hospitalización, obtenido del Registro de Actividad de Atención Especializada (epígrafe 0908 Enfermedades cerebrovasculares de la ISHMT)²⁴.

3) Estimación del coste total de los cuidados informales.

Se realiza una estimación del coste de los cuidados informales asociados al ictus. Los datos provienen de Oliva-Moreno et al.²⁵, y para realizar la estimación se multiplican las horas de cuidado informal registradas en la EDAD08 por el coste de hora de cuidado informal contemplado en la bibliografía (7,67 €/hora).

OBJETIVO 5.

Análisis de la situación actual de la anticoagulación por FANV en la Comunidad Valenciana y del impacto del seguimiento de las recomendaciones de práctica clínica para el manejo de la FANV.

Estimación del ahorro en eventos (ictus y hemorragias mayores).

La estimación del ahorro se ha realizado a partir de la aplicación de las tasas de eventos por 100 personas-año de cada tipo de evento analizado²⁶ a dos escenarios diferentes de uso de Anticoagulantes Orales Directos (ACODs):

- El escenario actual en la Comunidad Valenciana²⁷.
- Un escenario hipotético en línea con las recomendaciones de práctica clínica^{28,29}, basado en las cuotas de uso de la Unión Europea (UE-15)³⁰.

Este análisis se ha realizado teniendo como referencia la estimación del número de pacientes con FANV (mediante la aplicación de su prevalencia^{31,32} a las cifras de población oficiales¹⁷).

Como resultado se ha obtenido el número estimado de ictus (isquémicos y hemorrágicos) y de hemorragias mayores que se producirían anualmente en cada escenario, y se han multiplicado por el coste unitario de los mismos, 27.711 € por cada evento de ictus²³ y 6.777 € por cada hemorragia mayor^{33,34}. En el caso del ictus, su precio unitario incluye los costes directos sanitarios, los costes directos no sanitarios y los costes indirectos²³, y en el caso de las hemorragias mayores, se incluyen los costes directos sanitarios³³, que corresponden al coste medio de los GRD vinculados³⁴.

La hemorragia mayor contemplada en este análisis se define como el sangrado fatal, y/o sangrado sintomático en un área u órgano crítico, como intracraneal, intrarraquídeo, intraocular, retroperitoneal, intra-articular o pericárdico, o intramuscular con síndrome compartimental, y/o sangrado que causa un descenso de los niveles de hemoglobina de 2 g/dl (1,24 mmol/l) o más, o que requiere la transfusión de dos o más unidades de sangre completa o eritrocitos³⁵.

Se han comparado los eventos y los costes asociados a las cuotas de uso reales en la Comunidad Valenciana y al escenario hipotético basado en las cuotas de uso europeas, y se ha calculado la diferencia entre ambos, en términos de ictus, hemorragias mayores y costes potencialmente evitables^{17,23,26,27,30-34}. Las cifras se han redondeado a números enteros ocasionando ligeras discrepancias en los resultados.



RESULTADOS

1 Epidemiología y perfil sociodemográfico de los pacientes con ictus

Aplicando la incidencia reportada por el estudio IBERICTUS⁵ a cifras poblacionales de 1 de enero de 2018¹⁷, en la Comunidad Valenciana habría 7.597 casos nuevos al año, el 53% en hombres y el 47% en mujeres.

En relación con la hospitalización, en 2015 en la Comunidad Valenciana hubo un total de 10.649 altas hospitalarias por ictus, de las cuales el 55,8% fueron relativas a hombres (TABLA 6).

TABLA 6. NÚMERO DE ALTAS HOSPITALARIAS POR ICTUS SEGÚN SEXO. COMUNIDAD VALENCIANA, 2015.

ZONA GEOGRÁFICA	Nº DE ALTAS	% HOMBRES	% MUJERES
Comunidad Valenciana	10.649	55,8%	44,2%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalizaciones²⁴.

Por tramos de edad, del total de altas hospitalarias en la Comunidad Valenciana el 72,8% correspondieron a personas de 65 años o más (TABLA 7).

TABLA 7. NÚMERO DE ALTAS HOSPITALARIAS POR ICTUS SEGÚN INTERVALOS DE EDAD. COMUNIDAD VALENCIANA, 2015.

ZONA GEOGRÁFICA	Nº DE ALTAS	% <65 AÑOS	% ≥65 AÑOS
Comunidad Valenciana	10.649	27,2%	72,8%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalizaciones²⁴.

De acuerdo con datos propios de la Comunidad Valenciana, el ictus con infarto fue una de las tres primeras causas de ingreso hospitalario, con 6.225 altas que tuvieron una estancia media de 8,16 días (TABLA 8).

TABLA 8. ALTAS HOSPITALARIAS POR ICTUS. COMUNIDAD VALENCIANA, 2017.

GRUPOS DE POBLACIÓN	ALTAS	ESTANCIA MEDIA (DÍAS)
Ictus	6.225	8,16

Fuente: Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 2017²⁰.

Según la última ENSE de 2017¹⁸, la prevalencia del ictus en esta Comunidad sería del 1,7% en población de 15 años o más y equivaldría a un total de 70.298 personas en 2018¹⁷.

Por otro lado, según datos oficiales en 2016 se produjeron 2.839 defunciones debido a las enfermedades cerebrovasculares¹⁹, constituyéndose como la primera causa de muerte en ambos sexos, la tercera en hombres (por detrás de la causa 018 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón, y 056 Otras enfermedades isquémicas del corazón) y la primera en mujeres (TABLA 9). Según datos del INE la tasa de mortalidad en la Comunidad Valenciana fue de 27,4 por 100.000 habitantes en la población general y de 31,0 para hombres y 24,1 para mujeres³⁶. Del total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares, el 56% fueron relativas a mujeres y se produjeron a una edad media de 84 años, frente a un 44% hombres que fallecieron a los 78 años de media.

TABLA 9. POSICIÓN DEL ICTUS EN LAS CAUSAS BÁSICAS DE DEFUNCIÓN (LISTA REDUCIDA) SEGÚN CIE-10. COMUNIDAD VALENCIANA, 2016.

	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Todas las causas	42.697	21.912	20.785
059 Enfermedades cerebrovasculares	2.839	1.238	1.601
018 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.469	1.951	518
056 Otras enfermedades isquémicas del corazón	2.301	1.374	927
058 Otras enfermedades del corazón	2.258	995	1.263
057 Insuficiencia cardíaca	2.071	797	1.274

	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
051 Enfermedad de Alzheimer	1.805	539	1.266
067 Otras enfermedades del sistema respiratorio	1.739	818	921
046 Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	1.701	564	1.137
054 Enfermedades hipertensivas	1.382	485	897
055 Infarto agudo de miocardio	1.378	892	486

Fuente: Instituto Nacional de Estadística¹⁹.

En la TABLA 10 se incluye la comparación del perfil sociodemográfico de las personas que habían padecido un ictus y otros grupos de enfermedades en la Comunidad Valenciana. Los ictus se producen en personas de mayor edad, varones y con menor nivel de estudios en comparación con otras enfermedades y la población sana.

TABLA 10. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO. COMUNIDAD VALENCIANA, 2017.

	ICTUS	OTRAS ENFERMEDADES CRÓNICAS	POBLACIÓN SANA
N válido	69.544	2.707.427	1.379.317
Edad	Mediana	69,0	54,0
	≥ 65 años (%)	66,4%	31,1%
Sexo	Hombres (%)	52,3%	46,7%
	Mujeres (%)	47,7%	53,3%
Nivel de estudios	Primarios o sin estudios (%)	68,7%	31,8%
	Estudios secundarios (%)	16,3%	52,4%
	Estudios universitarios (%)	15,0%	15,8%

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2017) – Cuestionario Adultos¹⁸.

2 Consumo de recursos sanitarios

2.1 Destino al alta hospitalaria

El tipo de alta por ictus de mayor frecuencia fue el traslado a domicilio, con un 71,6%, seguido del exitus (13,8%) (TABLA 11).

TABLA 11. TIPO DE ALTA HOSPITALARIA POR ICTUS. COMUNIDAD VALENCIANA, 2015.

ZONA GEOGRÁFICA	Nº DE ALTAS	TRASLADO A OTRO HOSPITAL	TRASLADO A OTRO CENTRO SOCIO SANITARIO	TRASLADO A DOMICILIO	EXITUS	ALTA VOLUNTARIA / OTRO
Comunidad Valenciana	10.649	12,7%	1,3%	71,6%	13,8%	0,6%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalizaciones²⁴.

2.2 Utilización de recursos sanitarios

Según datos de la ENSE, en 2017 en la Comunidad Valenciana, el 49,5% de las personas que padecieron un ictus visitaron al médico general o de familia y el 34,1% a un médico especialista en las últimas cuatro semanas. Por otro lado, en los últimos 12 meses el 50,4% de las personas que padecieron un ictus usaron los servicios de urgencias y un 18,3% tuvieron algún ingreso hospitalario (TABLA 12).

TABLA 12. VISITAS MÉDICAS, URGENCIAS Y HOSPITALIZACIONES. COMUNIDAD VALENCIANA, 2017.


		ICTUS	ENFERMEDADES CRÓNICAS	POBLACIÓN SANA
En las últimas 4 semanas	Pacientes que han consultado al médico general, N (%)	34.445 (49,5%)	991.578 (36,6%)	240.363 (17,4%)
	Pacientes que han consultado al médico especialista, N (%)	23.732 (34,1%)	527.963 (19,5%)	93.919 (6,8%)
En los últimos 12 meses	Pacientes que han acudido a urgencias, N (%)	35.039 (50,4%)	923.453 (34,1%)	314.371 (22,8%)
	Pacientes que se han hospitalizado, N (%)	12.706 (18,3%)	272.158 (10,1%)	46.269 (3,4%)

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2017) – Cuestionario Adultos¹⁸.



De acuerdo con la FIGURA 1, en la Comunidad Valenciana, las personas que padecieron un ictus acudieron en mayor proporción a la enfermera/matrona, con un 29,7%, mientras que para las personas con otras enfermedades crónicas fue de 13,2% y de 7,3% para la población sana.

FIGURA 1. VISITAS A OTROS ESPECIALISTAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2017.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2017) – Cuestionario Adultos¹⁸.



2.3 Utilización de servicios de ayuda domiciliaria

En la FIGURA 2, se puede observar que las personas que padecieron un ictus utilizaron en mayor proporción los servicios de ayuda domiciliaria, siendo el servicio de enfermería/matrona el más utilizado, con un 17% (frente a un 2,2% para otras enfermedades crónicas), seguido por transporte (9,3%) y otros servicios (7%).

FIGURA 2. SERVICIOS ASISTENCIALES DE AYUDA DOMICILIARIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2017.



*Sólo personas de 65 años o más.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2017) – Cuestionario Adultos¹⁸.




3 Carga social del ictus

3.1 Estado de salud y calidad de vida

Como se puede observar en la FIGURA 3 en 2017 existía, en relación a otros enfermos crónicos y la población sana, una mayor proporción de personas que padecieron un ictus en un estado de salud de regular a muy malo: el 76,8% frente al 38,1% de otros enfermos crónicos y el 6% de la población sana. De manera complementaria, sólo el 5% de las personas que padecieron un ictus mencionaron tener un estado de salud muy bueno, siendo para otras enfermedades crónicas del 14,7% y 51,2% para la población sana.

FIGURA 3. ESTADO DE SALUD AUTOPERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2017.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2017) – Cuestionario Adultos¹⁸.

De acuerdo con los datos de la última EDAD08, las personas con discapacidad que padecieron un ictus tenían, en comparación con otros enfermos crónicos, una peor percepción de su salud: un 34,4% mala y un 13,6% muy mala, frente a un 24,2% y 4% en otras enfermedades crónicas.

En relación con el estado de salud mental, las personas que padecieron un ictus tuvieron una media de 1,1 (DE: 2,2) puntos en el cuestionario GHQ-12, mayor a la de las personas con otras enfermedades crónicas, 0,6 (DE: 1,8) y la población sana, 0,2 (DE: 1,3), lo que indica que tenían un peor estado de salud mental que el resto de la población (TABLA 13).

TABLA 13. NIVEL DE SALUD MENTAL SEGÚN EL CUESTIONARIO GHQ-12 POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2017.

GRUPOS DE POBLACIÓN	Nº DE CASOS VÁLIDO	MEDIA	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	MEDIANA	MÍNIMO*	MÁXIMO*
Ictus	27.711	1,1	2,2	0,0	0,0	9,0
Otras enfermedades crónicas	574.247	0,6	1,8	0,0	0,0	12,0
Población sana	118.591	0,2	1,3	0,0	0,0	12,0

*0 es la menor puntuación posible y 12 la máxima. A mayor puntuación, peor estado de salud mental.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2017) – Cuestionario Adultos¹⁸.

Los resultados del cuestionario de calidad de vida EQ-5D-5L de la ENSE 2012 muestran que un 44,9% de las personas que padecieron un ictus presentaban problemas para caminar y un 19,7% no podían caminar. Para otras enfermedades crónicas este último porcentaje es únicamente del 1,2% y del 0% para la población sana (TABLA 14).

TABLA 14. NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN EL CUESTIONARIO EQ-5D-5L (DIMENSIÓN MOVILIDAD) POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2012.

GRUPOS DE POBLACIÓN		NINGÚN PROBLEMA PARA CAMINAR	PROBLEMA LEVE PARA CAMINAR	PROBLEMA MODERADO PARA CAMINAR	PROBLEMA GRAVE PARA CAMINAR	IMPOSIBILIDAD DE CAMINAR	TOTAL
Ictus	Nº	23.068	6.384	10.861	12.002	12.854	65.169
	%	35,4%	9,8%	16,7%	18,4%	19,7%	100%
Otras enfermedades crónicas	Nº	2.314.897	242.656	177.764	99.327	35.784	2.870.429
	%	80,6%	8,5%	6,2%	3,5%	1,2%	100%
Población sana	Nº	1.229.946	19.873	10.140	0	0	1.259.960
	%	97,6%	1,6%	0,8%	0,0%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2012) – Cuestionario Adultos³⁷.

En relación con la dimensión de autocuidado, el 22,8% de las personas que padecieron un ictus tenían la imposibilidad de lavarse o vestirse, frente a un 1,3% de las personas con otras enfermedades crónicas y 0% de la población sana (TABLA 15).

TABLA 15. NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN EL CUESTIONARIO EQ-5D-5L (DIMENSIÓN AUTOCUIDADO) POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2012.

GRUPOS DE POBLACIÓN		NINGÚN PROBLEMA PARA LAVARSE O VESTIRSE	PROBLEMA LEVE PARA LAVARSE O VESTIRSE	PROBLEMA MODERADO PARA LAVARSE O VESTIRSE	PROBLEMA GRAVE PARA LAVARSE O VESTIRSE	IMPOSIBILIDAD DE LAVARSE O VESTIRSE	TOTAL
Ictus	Nº	35.817	4.033	3.243	7.198	14.877	65.169
	%	55,0%	6,2%	5,0%	11,0%	22,8%	100%
Otras enfermedades crónicas	Nº	2.688.214	61.027	53.530	31.070	36.588	2.870.429
	%	93,7%	2,1%	1,9%	1,1%	1,3%	100%
Población sana	Nº	1.259.960	0	0	0	0	1.259.960
	%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2012) – Cuestionario Adultos³⁷.

Para las actividades cotidianas, en la TABLA 16 se puede observar que el 19,6% de las personas que padecieron un ictus mencionaron no poder realizar sus actividades cotidianas en absoluto, frente a un 2% de las personas con otras enfermedades crónicas y 0% en la población sana.

TABLA 16. NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN EL CUESTIONARIO EQ-5D-5L (DIMENSIÓN ACTIVIDADES COTIDIANAS) POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2012.

GRUPOS DE POBLACIÓN		NINGÚN PROBLEMA PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS	PROBLEMA LEVE PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS	PROBLEMA MODERADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS	PROBLEMA GRAVE PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS	TOTAL
Ictus	Nº	23.320	10.398	8.333	10.357	12.761	65.169
	%	35,8%	16,0%	12,8%	15,9%	19,6%	100%
Otras enfermedades crónicas	Nº	2.484.180	149.015	126.707	54.420	56.106	2.870.429
	%	86,5%	5,2%	4,4%	1,9%	2,0%	100%
Población sana	Nº	1.248.010	6.795	5.154	0	0	1.259.960
	%	99,1%	0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2012) – Cuestionario Adultos³⁷.

En la dimensión de dolor o malestar, solamente el 49,2% de las personas que padecieron un ictus mencionaron no presentar ningún tipo de dolor, frente a un 70,3% en otras enfermedades crónicas y 95,7% en la población sana. De manera complementaria, un 44,2% de las personas que padecieron un ictus mencionaron tener dolor o malestar de leve a fuerte y un 6,6% dolor extremo (TABLA 17).

TABLA 17. NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN EL CUESTIONARIO EQ-5D-5L (DIMENSIÓN DOLOR O MALESTAR) POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2012.

GRUPOS DE POBLACIÓN		NO PRESENTA DOLOR	DOLOR O MALESTAR LEVE	DOLOR O MALESTAR MODERADO	DOLOR O MALESTAR FUERTE	DOLOR O MALESTAR EXTREMO	TOTAL
Ictus	Nº	32.052	6.944	18.756	3.095	4.321	65.169
	%	49,2%	10,7%	28,8%	4,7%	6,6%	100%
Otras enfermedades crónicas	Nº	2.016.594	328.002	321.138	181.352	23.343	2.870.429
	%	70,3%	11,4%	11,2%	6,3%	0,8%	100%
Población sana	Nº	1.205.213	44.388	6.383	3.975	0	1.259.960
	%	95,7%	3,5%	0,5%	0,3%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2012) – Cuestionario Adultos³⁷.

Para la dimensión de ansiedad o depresión, casi un 29,5% de las personas que padecieron un ictus mencionaron presentar ansiedad o depresión de leve a fuerte. Para otras enfermedades crónicas dicha proporción es del 20,1% y para la población sana del 3,1% (TABLA 18).

TABLA 18. NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN EL CUESTIONARIO EQ-5D-5L (DIMENSIÓN ANSIEDAD O DEPRESIÓN) POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2012.

GRUPOS DE POBLACIÓN		NO PRESENTA ANSIEDAD NI DEPRESIÓN	ANSIEDAD O DEPRESIÓN LEVE	ANSIEDAD O DEPRESIÓN MODERADA	ANSIEDAD O DEPRESIÓN FUERTE	ANSIEDAD O DEPRESIÓN EXTREMA	TOTAL
Ictus	Nº	42.756	6.611	9.216	2.069	0	60.651
	%	70,5%	10,9%	15,2%	3,4%	0,0%	100%
Otras enfermedades crónicas	Nº	2.283.168	318.767	183.061	73.384	12.049	2.870.429
	%	79,5%	11,1%	6,4%	2,6%	0,4%	100%
Población sana	Nº	1.221.362	33.695	4.903	0	0	1.259.960
	%	96,9%	2,7%	0,4%	0,0%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2012) – Cuestionario Adultos³⁷.

Las personas que habían padecido un ictus presentaban una media de $0,53 \pm 0,45$ AVAC anuales, lo que significa una menor calidad de vida relacionada con la salud frente al resto de grupos: $0,88 \pm 0,23$ en los otros enfermos crónicos y $0,99 \pm 0,04$ en la población sana.


3.2 Dependencia

Según se explica en la metodología, los datos sobre dependencia se obtienen de dos fuentes (la ENSE 2017 y la EDAD08) y, por tanto, se presentan por separado en personas mayores de 65 años, que se comparan con otras enfermedades crónicas y población sana, y con otras enfermedades crónicas con discapacidad, respectivamente.

3.2.1 Personas de 65 años o más

De acuerdo con los datos de la ENSE 2017 para personas de 65 años o más en la FIGURA 4 se puede observar que aquellas que padecieron un ictus tenían en mayor proporción dificultades para realizar actividades básicas de la vida diaria. La mayor diferencia se presenta para ducharse o bañarse sin ayuda, con un 61%, frente a un 16,3% de las personas con otras enfermedades crónicas y un 9,1% en la población sana.

FIGURA 4. DIFICULTADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES BÁSICAS DIARIAS POR GRUPOS DE POBLACIÓN*. COMUNIDAD VALENCIANA, 2017.



*Personas de 65 años o más.


Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2017)– Cuestionario Adultos¹⁸.



Por otra parte, del total de personas que padecieron un ictus que tenían dificultades en algún tipo de actividad básica diaria, el 84,4% disponían de ayuda para realizar sus actividades básicas, porcentaje ligeramente mayor al de otras enfermedades crónicas (83,8%) y al de la población sana (67,6%).

En relación con el tipo de dificultad que tenían para realizar actividades básicas diarias, en la FIGURA 5 se puede observar que las personas que padecieron ictus tenían en mayor proporción dificultades en todas las áreas analizadas, siendo la administración de su propio dinero la que presenta mayor diferencia (64,6%) frente a otras enfermedades crónicas (18,2%) y la población sana (9,1%). De manera complementaria, el área de mayor dificultad para las personas que padecieron un ictus era la realización de actividades domésticas de gran esfuerzo, con 70,1%.

FIGURA 5. DIFICULTADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR POR GRUPOS DE POBLACIÓN*. COMUNIDAD VALENCIANA, 2017.



*Personas de 65 años o más.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2017) – Cuestionario Adultos¹⁸.




3.2.2 Personas con discapacidad

El 11,2% de las personas que padecieron un ictus y que tenían discapacidad recibieron ayudas económicas o indemnizaciones en los últimos 12 meses (el 11% de las mujeres, con una media de 8.383€/persona/año y el 11% de los hombres, con una media de 9.927€/persona/año), frente a un 8,2% en otras enfermedades crónicas.

De acuerdo con el tipo de subsidio económico recibido, las pensiones contributivas fueron las de mayor peso en ambos grupos, siendo mayor la proporción para las personas que padecieron un ictus (50,4%) frente a otras enfermedades crónicas (44,6%) (FIGURA 6).

FIGURA 6. TIPO DE SUBSIDIO ECONÓMICO RECIBIDO POR DISCAPACIDAD, POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2008.



*Prestaciones LISMI, pensiones asistenciales, prestaciones económicas por dependencia, salario de inserción social, ayudas a la familia, programas de ayudas de comunidades autónomas, entre otras.


Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008. Cuestionario de Discapacidades³⁸.

En relación con las prestaciones monetarias no periódicas, las personas que padecieron un ictus las recibieron en mayor proporción, con 11,5% frente a un 9,2% en otras enfermedades crónicas. En relación al ictus, el 12% de las mujeres recibió este tipo de prestaciones (con una media de 30€/persona/año) y el 11% de los hombres.

De acuerdo con el tipo de prestación no periódica, las denominadas "para facilitar la autonomía" y "rehabilitación o asistencia especializada" fueron los únicos tipos de prestaciones monetarias no periódicas que recibieron las personas que padecieron un ictus, en el primer caso un 6,3% (1% para otras enfermedades crónicas) y en el segundo caso un 5,3% (0% para otras enfermedades crónicas) (FIGURA 7).



FIGURA 7. TIPO DE PRESTACIÓN MONETARIA NO PERIÓDICA RECIBIDA POR DISCAPACIDAD, POR GRUPOS DE POBLACIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA, 2008.



* Ayudas técnicas y para la accesibilidad y adaptación en el hogar.

Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008. Cuestionario de Discapacidades³⁸.

El 81% de las mujeres con ictus recibían asistencia o cuidados personales debido a su discapacidad, frente al 67% de los hombres con ictus y discapacidad.

4 Carga económica asociada al ictus

4.1 Coste asociado a los casos incidentes de ictus

A continuación, se exponen los principales hallazgos sobre la carga económica asociada al ictus, en relación con los casos incidentes, el manejo en la fase aguda y los cuidados informales.

De acuerdo con los datos disponibles más recientes, el coste anual de cada paciente con ictus incluyendo los costes directos (sanitarios y no sanitarios) e indirectos es de 27.711 € durante el primer año²³. A partir de la estimación de nuevos casos anuales (7.597) realizada anteriormente, **el coste anual de los nuevos casos de ictus en la Comunidad Valenciana se estima en 210,52 millones de euros (M€)** (TABLA 19).

TABLA 19. COSTE TOTAL DE NUEVOS CASOS DE ICTUS AL AÑO. COMUNIDAD VALENCIANA

NUEVOS CASOS DE ICTUS	COSTE (M€)
7.597	210,52 M€

Fuente: Elaboración propia a partir de Díaz-Guzmán et al.⁵, INE¹⁷ y Alvarez-Sabín et al.²³.

4.2 Coste asociado a los cuidados en la fase aguda del ictus

Teniendo en cuenta el número total de hospitalizaciones, que fue de 10.649 en el año 2015, y el coste medio por hospitalización por ictus por paciente (6.551,95 €)²⁴, **el coste total anual en hospitalizaciones por ictus en la Comunidad Valenciana se estima en 69,77 M€** (TABLA 20).

TABLA 20. HOSPITALIZACIONES POR ICTUS, COSTE MEDIO Y COSTE TOTAL. COMUNIDAD VALENCIANA, 2015

NÚMERO TOTAL DE HOSPITALIZACIONES	COSTE POR CADA HOSPITALIZACIÓN	COSTE TOTAL (M€)
10.649	6.551,95 €	69,77 €

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalizaciones²⁴.

4.3 Coste asociado a los cuidados informales

Para calcular el coste de los cuidados informales se ha utilizado como referencia el artículo de Oliva-Moreno et al.²⁵. Para realizar la estimación se multiplican las horas de cuidado informal registradas en la EDAD08 para la Comunidad Valenciana por el coste de hora de cuidado informal contemplado en la bibliografía (7,67 €/hora). En la Comunidad Valenciana, el coste total del cuidado informal equivale a **749 M€**.



5 Situación actual de la anticoagulación

La FA afecta al 4,4% de la población de 40 años o más³¹, lo que supone un total de 119.040 personas en La Comunidad Valenciana^{17,31}. De éstas, el 85% presentan FANV³², es decir, 101.184 personas^{17,31,32}.

Según la población con FANV y las cuotas de uso actuales en la Comunidad Valenciana, se producen un total de 666 ictus y 2.042 hemorragias mayores asociadas a la antivitamina K, a la vez que se dan 156 ictus y 829 hemorragias mayores asociadas a los ACODs (TABLA 21).

TABLA 21. EVENTOS TOTALES SEGÚN CUOTAS DE USO ACTUALES. COMUNIDAD VALENCIANA, 2018.

FÁRMACOS	CUOTAS DE USO ACTUALES	NÚMERO DE PACIENTES	ICTUS 100 PERSONAS-AÑO	ICTUS TOTALES	HEMORRAGIAS MAYORES 100 PERSONAS-AÑO	HEMORRAGIAS MAYORES TOTALES
Antivitamina K	61,5%	62.254	1,07	666	3,28	2.042
ACODs	38,5%	38.929	0,40	156	2,13	829
TOTAL	100%	101.184	No aplica	822	No aplica	2.871

Fuente para cuotas de uso en la Comunidad Valenciana: IQVIA, 2018²⁷.

Fuente para número de pacientes: INE, 2018¹⁷, Gómez-Doblas et al., 2014³¹, Zoni-Berisso et al., 2014³² y IQVIA, 2018²⁷.

Fuente para eventos 100 personas-año: Anguita Sánchez et al., 2019²⁶.

Fuente para eventos totales: INE, 2018¹⁷, Gómez-Doblas et al., 2014³¹, Zoni-Berisso et al., 2014³², IQVIA, 2018²⁷ y Anguita Sánchez et al., 2019²⁶.

Multiplicando el número de eventos totales de ictus y hemorragias mayores en los pacientes en tratamiento para la FANV por sus precios unitarios (Ver Metodología), se observa que el coste total asociado a su manejo asciende a 42,23 M€ en la Comunidad Valenciana (TABLA 22).

TABLA 22. COSTES ASOCIADOS A EVENTOS TOTALES SEGÚN CUOTAS DE USO ACTUALES. COMUNIDAD VALENCIANA, 2018.

FÁRMACOS	NUEVOS ICTUS	HEMORRAGIAS MAYORES	TOTAL
Antivitamina K	18.459.516 €	13.838.764 €	32.298.279 €
ACODs	4.315.255 €	5.619.698 €	9.934.953 €
TOTAL	22.774.771 €	19.458.462 €	42.233.233 €

Fuente para precios unitarios: ictus (Álvarez-Sabín et al., 2017²³) y hemorragia mayor (Beguiristain et al., 2005³³ y Osakidetza, 2018³⁹).

Fuente para coste de los ictus: INE, 2018¹⁷, Gómez-Doblas et al., 2014³¹, Zoni-Berisso et al., 2014³², IQVIA, 2018²⁷, Anguita Sánchez et al., 2019²⁶ y Álvarez-Sabín et al., 2017²³.

Fuente para coste de las hemorragias mayores: INE, 2018¹⁷, Gómez-Doblas et al., 2014³¹, Zoni-Berisso et al., 2014³², IQVIA, 2018²⁷, Anguita Sánchez et al., 2019²⁶, Beguiristain et al., 2005³³ y Osakidetza, 2018³⁹.

En un escenario hipotético, a partir de la población con FANV en la Comunidad Valenciana y la equiparación de las cuotas de uso actuales a las de Europa UE-15, se producirían un total de 348 ictus y 1.065 hemorragias mayores asociadas a la antivitamina K, a la vez que se darían 275 ictus y 1.463 hemorragias mayores asociadas a los ACODs (TABLA 23).

TABLA 23. EVENTOS TOTALES SEGÚN CUOTAS DE USO EUROPEAS. COMUNIDAD VALENCIANA, 2018.

FÁRMACOS	CUOTAS DE USO EUROPA UE-15	NÚMERO DE PACIENTES	ICTUS 100 PERSONAS-AÑO	ICTUS TOTALES	HEMORRAGIAS MAYORES 100 PERSONAS-AÑO	HEMORRAGIAS MAYORES TOTALES
Antivitamina K	32,1%	32.480	1,07	348	3,28	1.065
ACODs	67,9%	68.704	0,40	275	2,13	1.463
TOTAL	100,0%	101.184	No aplica	622	No aplica	2.529

Fuente para cuotas de uso en Europa (UE-15): IQVIA, 2018³⁰.

Fuente para número de pacientes: INE, 2018¹⁷, Gómez-Doblas et al., 2014³¹, Zoni-Berisso et al., 2014³² y IQVIA, 2018³⁰.

Fuente para eventos 100 personas-año: Anguita Sánchez et al., 2019²⁶.

Fuente para eventos totales: INE, 2018¹⁷, Gómez-Doblas et al., 2014³¹, Zoni-Berisso et al., 2014³², IQVIA, 2018³⁰ y Anguita Sánchez et al., 2019²⁶.

Si se equiparasen las cuotas de uso actuales a las europeas, el coste total asociado a los eventos de ictus y hemorragias mayores se reduciría a 34,39 M€ (TABLA 24).

TABLA 24. COSTES ASOCIADOS A EVENTOS TOTALES SEGÚN CUOTAS DE USO EUROPEAS. COMUNIDAD VALENCIANA, 2018.

FÁRMACOS	NUEVOS ICTUS	HEMORRAGIAS MAYORES	TOTAL
Antivitamina K	9.630.906 €	7.220.115 €	16.851.022 €
ACODs	7.615.670 €	9.917.784 €	17.533.454 €
TOTAL	17.246.576 €	17.137.899 €	34.384.475 €

Fuente para precios unitarios: ictus (Álvarez-Sabín et al., 2017²³) y hemorragia mayor (Beguiristain et al., 2005³³ y Osakidetza, 2018³⁹).

Fuente para coste de los ictus: INE, 2018¹⁷, Gómez-Doblas et al., 2014³¹, Zoni-Berisso et al., 2014³², IQVIA, 2018³⁰, Anguita Sánchez et al., 2019²⁶ y Álvarez-Sabín et al., 2017²³.

Fuente para coste de las hemorragias mayores: INE, 2018¹⁷, Gómez-Doblas et al., 2014³¹, Zoni-Berisso et al., 2014³², IQVIA, 2018³⁰, Anguita Sánchez et al., 2019²⁶, Beguiristain et al., 2005³³ y Osakidetza, 2018³⁹.

Teniendo en cuenta ambos escenarios, se conseguirían evitar 199 nuevos casos de ictus, así como 342 hemorragias mayores, que equivaldrían a un ahorro total de 7,85 M€ en eventos (TABLA 25).

TABLA 25. DIFERENCIA EN NÚMERO DE EVENTOS Y COSTES ASOCIADOS TRAS LA EQUIPARACIÓN DE LAS CUOTAS DE USO ACTUALES A LAS EUROPEAS. COMUNIDAD VALENCIANA, 2018.

CUOTAS DE USO	NUEVOS ICTUS		HEMORRAGIAS MAYORES		COSTE TOTAL
	NÚMERO	COSTE ASOCIADO	NÚMERO	COSTE ASOCIADO	
Actuales	822	22.774.771 €	2.871	19.458.462 €	42.233.233 €
Europa UE-15	622	17.246.576 €	2.529	17.137.899 €	34.384.475 €
DIFERENCIA	199	5.528.195 €	342	2.320.563 €	7.848.757 €

El ahorro generado por el uso de ACODs podría ser mayor, ya que solamente se han considerado los costes directos sanitarios de las hemorragias mayores y no los costes indirectos.

Este trabajo, sin embargo, presenta una limitación a la hora de evaluar el ahorro en términos absolutos asociado a los anticoagulantes directos, dado que el sangrado cerebral podría estar incluido en ambos grupos, tanto en los ictus hemorrágicos como en las hemorragias mayores.



PUNTOS CLAVE



Cada año se generan **7.597 nuevos casos de ictus en la Comunidad Valenciana**^{5,17}, con su consecuente carga social (expresada en discapacidad y dificultades en la vida diaria) y económica (expresada en consumo de recursos sanitarios y pérdidas de productividad laboral por discapacidad y mortalidad).



Al año **mueren aproximadamente 2.839 personas** a causa de las enfermedades cerebrovasculares, siendo ésta la primera causa básica de defunción entre las mujeres y en ambos sexos, y la tercera entre los hombres¹⁹. Esto implica una carga social expresada en años de vida perdidos.



Dos de cada tres personas que sobreviven a un ictus presentan algún tipo de secuela, en muchos casos discapacitantes, lo que incrementa notablemente la necesidad de recibir asistencia o cuidados.

En comparación con otros enfermos crónicos y con la población sana, **el consumo de recursos sanitarios es mayor entre las personas que han padecido un ictus**, principalmente respecto al uso de urgencias y la hospitalización¹⁸.



El estado de salud autopercebido por las personas que han padecido un ictus es peor que el de otros enfermos crónicos y que la población sana. Asimismo, presentan peor estado de salud mental y tienen una mayor afectación en las distintas dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud, especialmente las actividades cotidianas y la movilidad¹⁸.



Dos de cada tres personas que padecieron un ictus en la Comunidad Valenciana tienen 65 años o más¹⁸, con lo que la edad unida al evento de ictus se traduce en mayores dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria, así como en una mayor necesidad de cuidado.



Los datos aportados justifican la necesidad de optimizar la asignación de recursos para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes con ictus para reducir el impacto de esta enfermedad.



La **prevención** relacionada con el tratamiento de los factores de riesgo modificables es la medida más efectiva en la reducción de eventos. Uno de los factores de riesgo modificables de mayor peso, por su prevalencia y por ser causa de ictus más graves es la **fibrilación auricular no valvular**, cuyo adecuado manejo repercute muy favorablemente en la reducción del impacto del ictus.



REFERENCIAS

1. Ruíz-Giménez N, González Ruano P, Suárez C. Abordaje del accidente cerebrovascular. *Inf Ter Sist Nac Salud*. 2002;26(4).
2. Stevens E, Emmett E, Wang Y, McKeivitt C, Wolfe CD. El impacto del ictus en Europa. Resumen. London: Stroke Alliance for Europe; 2017.
3. Boix R, del Barrio JL, Saz P, Reñé R, Manubens JM, Lobo A, et al. Stroke prevalence among the Spanish elderly: an analysis based on screening surveys. *BMC Neurol*. 2006;6:36, doi: 10.1186/1471-2377-6-36.
4. Díaz-Guzmán J, Bermejo-Pareja F, Benito-León J, Vega S, Gabriel R, Medrano MJ. Prevalence of Stroke and Transient Ischemic Attack in Three Elderly Populations of Central Spain. *Neuroepidemiology*. 2008;30(4):247-53, doi: 10.1159/000135643.
5. Díaz-Guzmán J, Egido J-A, Gabriel-Sánchez R, Barberá-Comes G, Fuentes-Gimeno B, Fernández-Pérez C, et al. Stroke and Transient Ischemic Attack Incidence Rate in Spain: The IBERICTUS Study. *Cerebrovasc Dis*. 2012;34(4):272-81, doi: 10.1159/000342652.
6. Stevens E, Emmett E, Wang Y, McKeivitt C, Wolfe CD. The burden of stroke in Europe. Appendix. London: Stroke Alliance for Europe; 2017.
7. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Portal estadístico. Área de inteligencia de gestión. Mortalidad por causa de muerte. España: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; s. f.
8. McKeivitt C, Fudge N, Redfern J, Sheldenkar A, Crichton S, Rudd AR, et al. Self-Reported Long-Term Needs After Stroke. *Stroke*. 2011;42(5):1398-403, doi: 10.1161/STROKEAHA.110.598839.
9. Crichton SL, Bray BD, McKeivitt C, Rudd AG, Wolfe CDA. Patient outcomes up to 15 years after stroke: survival, disability, quality of life, cognition and mental health. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2016;87(10):1091-8, doi: 10.1136/jnnp-2016-313361.
10. O'Donnell MJ, Chin SL, Rangarajan S, Xavier D, Liu L, Zhang H, et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. *The Lancet*. 2016;388(10046):761-75, doi: 10.1016/S0140-6736(16)30506-2.
11. American Stroke Association. Stroke Risk Factors You Can Control, Treat and Improve. www.Strokeassociation.Org. [accedido 21 febrero 2019]. Disponible en: <https://www.strokeassociation.org/en/about-stroke/stroke-risk-factors/stroke-risk-factors-you-can-control-treat-and-improve>.
12. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. Guía ESC/ESH 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. *Rev Esp Cardiol*. 2019;72(2):160.e1-160.e78, doi: 10.1016/j.recesp.2018.12.005.
13. Camm AJ, Kirchhof P, Lip GYH, Schotten U, Savelieva I, Ernst S, et al. Guías de práctica clínica para el manejo de la fibrilación auricular. 2.^a edición corregida. 8 de abril de 2011. *Rev Esp Cardiol*. 2010;63(12):1483, doi: 10.1016/S0300-8932(10)70275-X.
14. Freedman B, Potpara TS, Lip GYH. Stroke prevention in atrial fibrillation. *The Lancet*. 2016;388(10046):806-17, doi: 10.1016/S0140-6736(16)31257-0.

15. Cowan JC, Wu J, Hall M, Orlowski A, West RM, Gale CP. A 10 year study of hospitalized atrial fibrillation-related stroke in England and its association with uptake of oral anticoagulation. *Eur Heart J*. 2018;39(32):2975-83, doi: 10.1093/eurheartj/ehy411.
16. Roldán Rabadán I, Esteve-Pastor MA, Anguita-Sánchez M, Muñiz J, Camacho Siles J, Quesada MA, et al. Relation of quality of anticoagulation control with different management systems among patients with atrial fibrillation: Data from FANTASIA Registry. *Eur J Clin Invest*. 2018;48(5):e12910, doi: 10.1111/eci.12910.
17. Instituto Nacional de Estadística. Cifras de población. Series detalladas desde 2002. Resultados por Comunidades Autónomas. Población residente por fecha, sexo y edad. Datos de población residente a 1 de enero de 2018. [accedido 27 noviembre 2018]. Disponible en: <http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9681&L=0>.
18. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud 2017. Cuestionario de Adultos. [accedido 30 octubre 2017]. Disponible en: <https://www.mschs.gob.es/estadisticas/microdatos.do>.
19. Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según la causa de muerte 2016. Defunciones por comunidad y ciudad autónoma de residencia, causas (lista reducida), sexo y edad. [accedido 25 octubre 2018]. Disponible en: <http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p417/a2016/l0/&file=02001.px>.
20. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Memoria de Gestión. Comunidad Valenciana; 2017.
21. Goldberg D. A User's Guide to the General Health Questionnaire. NFER-NELSON; 1988.
22. Ramos-Goñi J, Pinto Prades J, Oppe M, Cabasés Hita J, Rivero-Arias O. Estimación del conjunto de valores para los estados de salud del EQ-5D-5L basados en las preferencias de la población española. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2014.
23. Alvarez-Sabín J, Quintana M, Masjuan J, Oliva-Moreno J, Mar J, Gonzalez-Rojas N, et al. Economic impact of patients admitted to stroke units in Spain. *Eur J Health Econ HEPAC Health Econ Prev Care*. 2017;18(4):449-58, doi: 10.1007/s10198-016-0799-9.
24. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Portal estadístico. Área de inteligencia y gestión. Registro de Actividad de Atención Especializada – RAE-CMBD. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. [accedido 30 octubre 2018]. Disponible en: <http://pestatistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/ArbolNodos.aspx?idNodo=6386>.
25. Oliva-Moreno J, Aranda-Reneo I, Vilaplana-Prieto C, González-Domínguez A, Hidalgo-Vega A. Economic valuation of informal care in cerebrovascular accident survivors in Spain. *BMC Health Serv Res*. 2013;13:508, doi: 10.1186/1472-6963-13-508.
26. Anguita Sánchez M, Bertomeu Martínez V, Ruiz Ortiz M, Cequier Fillat Á, Roldán Rabadán I, Muñiz García J, et al. Anticoagulantes orales directos frente a antagonistas de la vitamina K en pacientes del «mundo real» con fibrilación auricular no valvular. Estudio FANTASIA. *Rev Esp Cardiol*. 2019, doi: 10.1016/j.recesp.2019.02.003.
27. IQVIA. Tratamientos por día para la fibrilación auricular. Octubre 2018, promedio cuatrimestre móvil. Comunidades Autónomas. 2018.
28. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B, et al. Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en colaboración con la EACTS. *Rev Esp Cardiol*. 2017;70(1):50.e1-50.e84, doi: 10.1016/j.recesp.2016.11.014.
29. January CT, Wann LS, Calkins H, Chen LY, Cigarroa JE, Cleveland JC, et al. 2019 AHA/ACC/HRS Focused Update of the 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation. *Circulation*. 2019;CIR0000000000000665, doi: 10.1161/CIR.0000000000000665.

30. IQVIA. Tratamientos por día para la fibrilación auricular. Noviembre 2018. Unión Europea UE-15. 2018.
31. Gómez-Doblas JJ, Muñoz J, Martín JJA, Rodríguez-Roca G, Lobos JM, Awamleh P, et al. Prevalencia de fibrilación auricular en España. Resultados del estudio OFRECE. *Rev Esp Cardiol.* 2014;67(04):259-69, doi: 10.1016/j.recesp.2013.07.015.
32. Zoni-Berisso M, Lercari F, Carazza T, Domenicucci S. Epidemiology of atrial fibrillation: European perspective. *Clin Epidemiol.* 2014;6:213-20, doi: 10.2147/CLEP.S47385.
33. Beguiristain JM, Mar J, Arrazola A. Coste de la enfermedad cerebrovascular aguda. *Rev Neurol.* 2005;40(7):406-11.
34. País Vasco. Acuerdo de 25 de enero de 2018, del Consejo de administración del ente público Osakidetza, por el que se aprueban las tarifas por prestación de servicios sanitarios y docentes a terceros obligados al pago durante el ejercicio 2018. 2018.
35. Schulman S, Kearon C, on behalf of the subcommittee on control of anticoagulation of the Scientific and Standardization, committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Definition of major bleeding in clinical investigations of antihemostatic medicinal products in non-surgical patients. *J Thromb Haemost.* 2005;3(4):692-4, doi: 10.1111/j.1538-7836.2005.01204.x.
36. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Portal estadístico. Área de inteligencia y gestión. Mortalidad por causa de muerte. Tasa de Mortalidad ajustada 2016. [accedido 28 marzo 2019]. Disponible en: <https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/Comun/Informe.aspx?IdNodo=5012>.
37. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. Cuestionario de Adultos. [accedido 30 octubre 2018]. Disponible en: <https://www.mscbs.gob.es/estadisticas/microdatos.do>.
38. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia 2008. Instituto Nacional de Estadística/INEbase. [accedido 30 octubre 2018]. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultados&secc=1254736195313&idp=1254735573175.
39. Consejo de Administración Osakidetza. Tarifas para facturación de servicios sanitarios y docentes de Osakidetza para el año 2018. 2018.




ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Grupos de enfermedades comparados en la ENSE 2017.	12
Tabla 2. Información extraída de la ENSE 2017.	13
Tabla 3. Apartados de la ENSE 2017 a partir de los que se ha evaluado el estado de salud y las limitaciones en la realización de actividades de la vida cotidiana en pacientes con ictus.	14
Tabla 4. Información extraída de la EDAD08.	15
Tabla 5. Grupos de enfermedades comparados en la EDAD08.	15
Tabla 6. Número de altas hospitalarias por ictus según sexo. Comunidad Valenciana, 2015.	19
Tabla 7. Número de altas hospitalarias por ictus según intervalos de edad. Comunidad Valenciana, 2015.	20
Tabla 8. Altas hospitalarias por ictus. Comunidad Valenciana, 2017.	20
Tabla 9. Posición del ictus en las causas básicas de defunción (lista reducida) según CIE-10. Comunidad Valenciana, 2016.	20
Tabla 10. Perfil sociodemográfico. Comunidad Valenciana, 2017.	21
Tabla 11. Tipo de alta hospitalaria por ictus. Comunidad Valenciana, 2015.	22
Tabla 12. Visitas médicas, urgencias y hospitalizaciones. Comunidad Valenciana, 2017.	22
Tabla 13. Nivel de salud mental según el cuestionario GHQ-12 por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2017.	26
Tabla 14. Nivel de calidad de vida según el cuestionario EQ-5D-5L (dimensión movilidad) por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2012.	26
Tabla 15. Nivel de calidad de vida según el cuestionario EQ-5D-5L (dimensión autocuidado) por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2012.	27
Tabla 16. Nivel de calidad de vida según el cuestionario EQ-5D-5L (dimensión actividades cotidianas) por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2012.	27
Tabla 17. Nivel de calidad de vida según el cuestionario EQ-5D-5L (dimensión dolor o malestar) por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2012.	28
Tabla 18. Nivel de calidad de vida según el cuestionario EQ-5D-5L (dimensión ansiedad o depresión) por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2012.	28
Tabla 19. Coste total de nuevos casos de ictus al año. Comunidad Valenciana.	33
Tabla 20. Hospitalizaciones por ictus, coste medio y total. Comunidad Valenciana, 2015.	33
Tabla 21. Eventos totales según cuotas de uso actuales. Comunidad Valenciana, 2018.	35
Tabla 22. Costes asociados a eventos totales según cuotas de uso actuales. Comunidad Valenciana, 2018.	35
Tabla 23. Eventos totales según cuotas de uso europeas. Comunidad Valenciana, 2018.	36
Tabla 24. Costes asociados a eventos totales según cuotas de uso europeas. Comunidad Valenciana, 2018.	36
Tabla 25. Diferencia en número de eventos y costes asociados tras la equiparación de las cuotas de uso actuales a las europeas. Comunidad Valenciana, 2018.	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Visitas a otros especialistas durante los últimos 12 meses por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2017.	23
Figura 2. Servicios asistenciales de ayuda domiciliaria en los últimos 12 meses por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2017.	24
Figura 3. Estado de salud autopercebido en los últimos 12 meses por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2017.	25
Figura 4. Dificultades para realizar actividades básicas diarias por grupos de población*. Comunidad Valenciana, 2017.	29
Figura 5. Dificultades para realizar actividades relacionadas con el hogar por grupos de población*. Comunidad Valenciana, 2017.	30
Figura 6. Tipo de subsidio económico recibido por discapacidad, por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2008.	31
Figura 7. Tipo de prestación monetaria no periódica recibida por discapacidad, por grupos de población. Comunidad Valenciana, 2008.	32





EL ATLAS DEL ICTUS



COMUNIDAD VALENCIANA

2019